



## میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب و نیکل) در بافت عضله سس‌ماهی سر بزرگ (*Luciobarbus capito*) در رودخانه سفیدرود (استان گیلان)

حسینعلی شریفی ارده‌جانی<sup>۱</sup>، مسعود فرخ روز لاشیدانی<sup>۲\*</sup>، محمدرضا رحیمی بشر<sup>۳</sup>، حسین خارا<sup>۴</sup>، هادی ارشاد لنگرودی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> دانشجو، گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

<sup>۲</sup> استادیار، گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

<sup>۳</sup> استادیار، گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

<sup>۴</sup> دانشیار، گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

### چکیده

بزرگترین رودخانه حوضه جنوبی دریای خزر سفیدرود و مهم‌ترین ماهی بومی آن سس‌ماهی سر بزرگ می‌باشد. این رودخانه به دلیل طی کردن مسیر طولانی و عبور از مناطق مختلف در معرض ورود انواع آلاینده‌ها و از جمله فلزات سنگین قرار دارد. هدف این تحقیق بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین سرب و نیکل در بافت عضله سس‌ماهی در رودخانه سفیدرود بود. بدین منظور سه ایستگاه در طول مسیر انتخاب و در چهار فصل سال ۱۴۰۰ از این مناطق تعداد ۴۵ عدد سس‌ماهی توسط تورهای پرتابی صید شده است. نمونه‌ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل و پس از بیومتری از عضلات آن‌ها نمونه برداری و به روش هضم شیمیایی و به کمک دستگاه جذب اتمی میزان این فلزات تعیین گردید. نتایج نشان دادند که ماهیان صید شده در رودخانه سفیدرود در فصول و ایستگاه‌های مختلف در محدوده سنی  $3^+ - 1^+$  و وزن کل  $21/82 \pm 21/72$  گرم و طول کل  $1/97 \pm 25/19$  سانتی‌متر بود. میزان غلظت فلز سنگین سرب در عضله سس‌ماهی سر بزرگ سفیدرود  $0/58 \pm 0/1$  میکروگرم در هر گرم عضله و اختلاف معنی‌داری را در ایستگاه‌ها در فصول نشان داد ( $p < 0/05$ ). میزان متوسط یک ساله غلظت نیکل در عضلات  $4/11 \pm 83/4$  میکروگرم در هر گرم عضله بود. با توجه به این نتایج غلظت سرب در میزان پایین و با توجه با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و دیگر استانداردهای معتبر مصرف‌نشان‌دهنده میزان مجاز بوده ولی میزان نیکل در عضلات سس‌ماهی سر بزرگ سفیدرود بالا بوده و حتی از مقادیر ایمن مصرف برخی از شاخص‌ها اعداد بالاتری را نشان داده است.

### واژه‌های کلیدی:

رودخانه سفیدرود، سس‌ماهی سر بزرگ، *Luciobarbus capito*، فلزات سنگین، سرب، نیکل.

### نوع مقاله:

پژوهشی اصیل

<https://doi.org/10.22034/jair.10.4.5>

### تاریخچه مقاله:

دریافت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

پذیرش: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

### نویسنده مسئول مکاتبه:

حسینعلی شریفی ارده‌جانی، استادیار، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

ایمیل: [mfarokhrooz@yahoo.com](mailto:mfarokhrooz@yahoo.com)

## ۱ | مقدمه

فلزات سنگین به دلیل سمیت و پایداری به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌ها برای موجودات آبی و انسان شناخته شده‌اند (Yi and Zhang, 2012; Jia et al., 2017; Varol et al., 2019). این فلزات ممکن است به‌طور طبیعی در اکوسیستم‌های رودخانه‌ای وجود داشته باشند، با این حال، فعالیت‌های معدنی، پساب‌های صنعتی و فعالیت‌های کشاورزی منابع اصلی آنها هستند (Weber et al., 2013; Merciai et al., 2014; Karadede et al., 2004; Begum et al., 2013). فلزاتی مانند روی، کبالت، آهن و مس برای رشد موجودات ضروری بوده ولی آرسنیک، نیکل، سرب، جیوه و کادمیوم عناصر غیر ضروری و سمی

در نیمه دوم قرن بیستم، صنعتی شدن و رشد جمعیت، باعث آلودگی بیشتر منابع طبیعی شده به‌طوری‌که تخریب اکوسیستم‌ها به یک موضوع حاد تبدیل گردیده است. پساب‌های تخلیه شده از صنایع به زیست بوم‌های آبی حاوی بسیاری از ترکیبات سمی مانند فنل‌ها، روغن‌ها، آفت‌کش‌ها، فلزات سنگین و هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک هستند. این پساب‌ها پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب مانند دما، pH، اکسیژن محلول، کل جامدات و جامدات محلول تأثیر می‌گذارند. فعالیت‌های فشرده کشاورزی منجر به آلودگی رودخانه‌ها، به‌ویژه با عناصر کمیاب دارای پتانسیل تجمع زیستی بالا شده و در میان آنها

حوضه می‌باشد (Marvtdost Anarkoli, 2015). به دلیل احداث سد سفیدرود در پایین‌دست تلاقی دو شاخه اصلی رودخانه (قزل اوزن و شاهرود) در منجیل هم‌چنین سدهای انحرافی تاریک و سنگر، اراضی بسیاری از آب رودخانه سیراب شده و بنابراین رودخانه مذکور در تولید انواع محصولات کشاورزی، دامی و شیلات استان نقش مهمی را ایفا می‌نماید (Derikond and Farji, 2010).

ترکیب اصلی صید در آب‌های داخلی ایران را ماهیان متعلق به خانواده کپور ماهیان تشکیل می‌دهند که مهمترین آنها گونه‌های متعلق به جنس (*Luciobarbus*) نام قبلی، جنس (*Barbus*) می‌باشد (Coad, 2014). کپورماهیان دارای تعداد زیادی جنس هستند و برخی از جنس‌ها و گونه‌ها از جمله گونه سس‌ماهی سر بزرگ دارای ارزش اقتصادی است و از حشرات آبی مثل شیرونومیده‌ها و جلبک‌ها مانند دیاتومه‌ها تغذیه می‌کند (Abdoli and Naderi, 2004). سس‌ماهی سر بزرگ با طول بیش از یک متر از رشد خوبی برخوردار هستند، با این وجود به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ حفاظتی دارای اهمیت زیادی هستند (Sharghi *et al.*, 2011). سس‌ماهی سر بزرگ در فصل بهار تولید مثل می‌کند و از کفزیان و پلانکتون‌ها تغذیه می‌نماید (Abdoli and Naderi, 2004). سس‌ماهی سر بزرگ گونه‌ای است که علاوه بر ایران، وجود آن در کشورهای ترکیه، جمهوری‌های شوروی سابق و افغانستان نیز گزارش شده است. از اینگونه در ایران، دو جمعیت مختلف وجود دارد. یک جمعیت از آن، در دریای خزر و آب لب شور زندگی می‌کند و برای تولیدمثل و تکثیر طبیعی به رودخانه‌های حاشیه جنوبی دریای خزر مهاجرت می‌کند، از جمله به رودخانه‌های کورا، ارس، سفیدرود، گرگان رود، اترک، سردآبرود، چالوس، تجن، تنکابن و تالار مهاجرت می‌کند (Shajiei *et al.*, 2002). جمعیت دیگر که ساکن در رودخانه‌ها و معمولاً در قسمت‌های میانی رودخانه که دارای بستر قله‌ه سنگی می‌باشد، زندگی می‌کند. پراکنش آن در رودخانه‌های حوضه جنوبی دریای خزر از ارس تا اترک می‌باشد. این گونه دارای دو فرم مهاجر و ساکن آب شیرین است. نمونه‌ای از آن که در دریای خزر زندگی می‌کند، برای تخم‌ریزی به بیشتر رودخانه‌های حوضه جنوبی دریای خزر از سفیدرود و سرشاخه‌های قزل اوزن در غرب تا رودخانه اترک در شرق وارد می‌شود (Abdoli and Naderi, 2009). در سواحل جنوبی دریای خزر، از فروردین ماه تا تیرماه به صورت گروهی وارد رودخانه‌ها می‌شوند و در نقاط کم عمق با بستر سنگی تخم‌ریزی می‌کنند. نمونه ساکن آب شیرین آن نیز به طور دائم در قسمت‌های میانی رودخانه با بستر قله‌ه سنگی زیست می‌کند (Kazanchiev, 1981). از میان فلزات سنگین، سرب و نیکل نقش مهمی را در مسمومیت آبزیان و انسان دارند. این فلزات با آنزیم‌ها و پروتئین‌های حامل ترکیب می‌شوند و وارد یاخته‌ها شده و بر فعالیت سلول‌ها تأثیر می‌گذارند (Chen and Chen, 2001). مطالعات گذشته نیز این موارد را تأیید می‌کند. البته مطالعاتی نیز در خصوص وجود فلزات سنگین در رودخانه سفیدرود انجام گرفته که چند مورد زیر از شاخص‌ترین آن‌ها هستند.

برای موجودات، حتی در غلظت‌های پایین می‌باشند. هم‌چنین غلظت بالای فلزات ضروری نیز می‌تواند سمی باشد (Varol *et al.*, 2019; Subotic *et al.*, 2013; Yi and Zhang, 2012; Rajeshkumar and Li, 2018; Rajkowska and Protasowicki, 2013). فلزات سنگین گروه اصلی آلاینده‌ها را در فعالیت‌های صنعتی و زندگی روزمره تشکیل می‌دهند. مقادیر بیش از حد کروم، منگنز، آهن، کبالت، نیکل، مس، روی، کادمیوم و سرب در بسیاری از منابع آب شیرین گزارش شده است به طوری که آن‌ها برای مصارف خانگی، آبیاری و نیازهای صنعتی ناامن شده است. آلودگی فلزات سنگین به دلیل سمیت، پایداری، توزیع گسترده و تجزیه‌ناپذیری زیستی در زنجیره غذایی، به عنوان عوامل تهدیدکننده محیط زیست آبی، از اهمیت مطالعاتی زیادی برخوردار است (Sarker *et al.*, 2021). به دنبال انتقال لاینده‌ها به محیط‌های آبی، این احتمال به وجود می‌آید که ماهی‌مقادیاری از برخی فلزات سنگین را از طریق زنجیره غذایی یا از طریق آب از محیط جذب نماید (Canli and Atli., 2003). سطوح بالا از فلزات سنگین در ماهی ممکن است اثرات نامطلوب جدی برای سلامتی افرادی که ماهی می‌خورند ایجاد کند (Copat *et al.*, 2013; Alquezar *et al.*, 2006). بنابراین، مصرف ماهی‌های آلوده به یک نگرانی مهم در سراسر جهان تبدیل شده است (Rajeshkumar and Li, 2018; Saha *et al.*, 2016; Griboff *et al.*, 2017). ماهی، در صدر زنجیره غذایی آبزیان، می‌تواند فلزات را از دو مسیر اصلی: مستقیماً از آب از طریق آبشش، و به طور غیرمستقیم از غذا از طریق دستگاه گوارش جذب کند (Varol and Sünbül, 2020; Jia *et al.*, 2017). الگوهای تجمع در ماهی به میزان جذب و حذف بستگی دارد (Karadede *et al.*, 2004). غلظت عناصر می‌تواند تنوع قابل توجهی را در اندام‌ها یا بافت‌های مختلف ماهی نشان دهد. این تنوع عمدتاً به غلظت فلزات در آب و غذا بستگی دارد (Rajkowska and Protasowicki, 2013). هم‌چنین رفتار تغذیه، اندازه ماهی، زیستگاه، جنسیت، شرایط فیزیولوژیکی مانند وضعیت تخم‌ریزی، و شیمی آب مانند pH و سختی می‌تواند بر تجمع در بافت ماهی تأثیر بگذارد (Al-Yousuf *et al.*, 2000; Yi and Zhang, 2012). بنابراین، ماهی‌ها می‌توانند به عنوان شاخص‌های زیستی قابل اعتماد برای نظارت بر آلودگی در رودخانه‌ها استفاده شوند (Jia *et al.*, 2017; Varol and Sünbül, 2019).

سفیدرود بزرگترین و پرآب‌ترین رودخانه سواحل جنوب دریای خزر به دلیل وجود کاربران متعدد از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری، پرورش آبزیان و یک از مهمترین منابع آب در استان گیلان محسوب می‌شود (معصومی و حبیبی، ۱۴۰۰). مسیر عمومی رودخانه سفیدرود از محل سد سفیدرود در منجیل تا ابتدای دشت گیلان جنوب غربی به شمال شرقی و در منطقه کوچصفهان به سمت مشرق متمایل، در منطقه آستانه جهت خود را به سمت شمال ادامه داده تا به دریای خزر می‌ریزد (میرمشتاقی و همکاران، ۱۳۹۰). استان از نظر وضعیت منابع آب و حوضه‌های اصلی دارای چهار حوضه می‌باشد که رودخانه سفیدرود در دشت آستانه- کوچصفهان که حوضه میانی گیلان است، مهمترین رود این

این تحقیق در سال ۱۴۰۰ با انتخاب سه ایستگاه در طول مسیر رودخانه سفیدرود در استان گیلان آغاز و به صورت فصلی در هر ایستگاه، اقدام به صید ماهی سس از رودخانه سفید رود توسط تورهای پرتابی شد. ایستگاه‌ها با توجه به خصوصیات هر منطقه انتخاب و با توجه به اهمیت سموم کشاورزی ایستگاه ۱ قبل از سد سنگر (به دلیل تجمع فلز سنگین) و پل آستانه (ایستگاه ۲: به این دلیل که بیشتر مزارع برنج بین آستانه و سنگر قرار دارند) و مصب رودخانه (ایستگاه ۳: جمع‌بندی غلظت سموم در انتهای رودخانه) جهت نمونه‌برداری در رودخانه انتخاب شدند. طول و عرض جغرافیایی و جنس بستر ایستگاه‌های نمونه‌برداری در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱- مشخصات ایستگاه‌های نمونه‌برداری در رودخانه سفید رود

محل نمونه برداری	ایستگاه ۱ سد سنگر	ایستگاه ۲ پل سفید رود	ایستگاه ۳ پل کياشهر
طول جغرافیایی	۳۷ ۱' ۸"	۱۶' ۳۷/۸"	۲۵' ۰۴/۳"
عرض جغرافیایی	۳۷۴۹' ۳۴"	۴۹ ۵۵' ۵۶"	۵۴' ۴۱/۱"
جنس بستر	سنگ، شن، ماسه	سنگ، بزه، شن ماسه	شن، ماسه

نمونه‌های ماهی با تورهای پرتابی با چشمه‌های ۱۶، ۸ صید و پس از صید بایخ به آزمایشگاه انتقال و ماهیان در ابتدا زیست‌سنجی (سن، طول کل و وزن کل) و در ادامه از عضله آن‌ها نمونه‌برداری و در دیش پتری (شیشه ساعت) قرار داده شده و پس از آن برای خشک شدن در فر قرار داده شدند. نمونه‌ها به مدت ۱۵۰-۱۲۰ دقیقه و دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد در فر خشک شده تا به وزن ثابت برسند (AOAC, 1995)، سپس از فر خارج و برای هضم از روش تشک استفاده گردید. یک گرم پودر یکنواخت شده نمونه در یک ارلن مایر ریخته و به آن ۱۵ میلی‌لیتر محلول اسید نیتریک و اسید کلریدریک به نسبت ۱،۳ در سه مرحله هربار به میزان ۵ میلی‌لیتر اضافه شد و بعد از عمل رفلکس در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد محلول کاملاً شفاف به دست آمد. پس از سرد شدن، نمونه‌ها را با کاغذ صافی و اتمن ۰۷ صاف کرده و به حجم ۲۵ میلی‌لیتر رسانده و در ظرف پلی‌اتیلن تا هنگام خوانده شدن توسط دستگاه ICP-OES نگهداری شده (۹). پس از وارد کردن داده‌ها در نرم‌افزار Excel داده‌ها به نرم‌افزار SPSS-23 انتقال یافت. ابتدا نرمال بودن داده‌ها توسط آزمون Shepiro-Wilk بررسی شد سپس با آزمون واریانس یک‌طرفه و مقایسه میانگین آزمون دانکن و توکی در سطح ۹۵ درصد انجام شد.

### ۳ | نتایج


ماهیان صید شده در رودخانه سفیدرود در فصول و ایستگاه‌های مختلف در محدوده سنی ۳<sup>+</sup>- ۱<sup>+</sup> و متوسط وزن کل آنها ۲۱/۸۲ ± ۲۲۱/۷۲ گرم و متوسط طول کل آنها ۱/۹۷ ± ۲۵/۱۹ سانتی‌متر بوده

یا بیشتر بوده و بالاترین مقدار غلظت فلزات کروم و کادمیوم در نمونه های رسوب این منطقه مشاهده گردید و فعالیت‌های صنعتی و تخلیه فضلاب‌های شهری و روستایی علت آلودگی رسوبات رودخانه به کادمیوم و سرب مشخص شد (Iqbali Shamsabad et al., 2010). مواد آلی استخراجی از نمونه‌های آب نشان داد که علاوه بر وجود آلودگی هیدروکربن‌های نفتی، ترکیبات ناشناخته‌ای با منشا احتمالی از کود و سموم آلی کشاورزی و یا فعالیت‌های صنعتی مرتبط با مواد آلی به‌عنوان آلاینده های آلی در بعضی از ایستگاه‌ها وجود دارد. براساس نقشه‌های GIS، ساختارهای زمین‌شناسی واقع در حوضه آبریز بالا و میان دست رودخانه، نقش مستقیم و بارزی در مورد فلزات سنگین سه گانه به رودخانه سفید رود ندارد. برخی از مطالعات غلظت فلزات سنگین در عضلات ماهیان ایران نیز وجود این آلاینده ها را تایید می‌کند که به‌عنوان مثال: تجمع نیکل، کادمیوم و سرب در عضله میسر ماهی (*Rachycentron*) و ماهی سوکلا (*Argyrosomus hololepidotus*) در دریای عمان خلیج چابهار (Shahri and Velayatzadeh, 2017)، اندازه‌گیری نیکل در عضله ماهی سوکلا (*Canadum R.*) در گروه‌های مختلف طولی در صید آب‌های شمال غربی خلیج فارس (Jahangiri et al., 2016)، بررسی و مقایسه غلظت فلزات سنگین (نیکل، سرب، کادمیوم و روی) در عضله ماهیان شوریده، حلوا سیاه، شیر و کوتر در منطقه چابهار (Shahri et al., 2016)، ارزیابی خطر فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و آرسنیک در دو گونه ماهی شیربت (*Tor grypus*) و سیاه ماهی (*Capoeta capoeta*) در رودخانه حله بوشهر (Rumiani et al., 2015)، بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در بافت‌های مختلف ماهی کلیکا و سه خاره دریای خزر (Najm et al., 2014)، اندازه‌گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت‌های ماهی بیه (*Liza abu*) رودخانه‌های کارون و دز استان خوزستان (Velayatzadeh et al., 2016)، اندازه‌گیری و مقایسه فلزات سنگین (Fe, Cu, Mn, Zn) در ماهی بیه (*L. abu*) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان (Askari Sari et al., 2011)، بررسی میزان جیوه، سرب، روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی سوف حاجی طرخان (*Perca fluviatilis*) در دو ناحیه آب‌کنار و شیجان از تالاب انزلی در فصل بهار (Ashja et al., 2008)، بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (نیکل، سرب، کادمیوم و وانادیوم) ناشی از تأثیر آلودگی نفتی در بافت عضله ماهی یلی (*pelates quidrileneatus*) خلیج فارس (Tatina et al., 2018).

باتوجه به مطالعات گذشته این مطالعه به بررسی میزان تجمع فلزات سنگین نیکل و سرب در ماهی سس بزرگ در رودخانه سفیدرود پرداخته و هدف اصلی آن مشخص نمودن میزان غلظت آنها در این ماهی بوده و مشخص نماید با این میزان آیا از نظر مصرف انسانی این ماهی ایمن بوده یا خیر.

تعیین گردید و میانگین غلظت سرب در سنگر (۰/۶۹۷±۰/۳۳)، آستانه (۰/۴۶۵±۰/۱۲) و کیشهر (۰/۵۸۵±۰/۰۶) میلی‌گرم بر لیتر در طول یک‌سال بود (شکل ۳). آزمون میانگین با واریانس یک‌سویه اختلاف معنی‌داری را به ایستگاه‌ها در فصل نشان داد ( $p < 0.05$ ). آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در سنگر نسبت به آستانه و کیشهر نشان داد. میانگین غلظت سرب در بهار (۰/۵۳±۰/۱۰)، تابستان (۰/۵۷±۰/۱۲)، پاییز (۰/۶±۰/۱۲) و زمستان (۰/۶۲±۰/۳۰) میلی‌گرم بر لیتر بود. آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در بهار نسبت تابستان، پاییز و زمستان نشان داد ( $p < 0.05$ ). نتایج بررسی میزان غلظت نیکل در عضلات سس‌ماهی سر بزرگ در سفیدرود نشان داد که متوسط یک‌ساله تمامی ماهیان مورد آزمایش و در تمامی ایستگاه‌ها  $4/1 \pm 83/4$  میکروگرم در گرم عضله بوده و میانگین غلظت نیکل در سنگر (۴/۸±۱/۷۰)، آستانه (۴/۶±۰/۵۷) و کیشهر (۴/۸±۱/۸۹) میلی‌گرم بر لیتر در طول یک‌سال بود (جدول ۴). آزمون میانگین با واریانس یک‌سویه اختلاف معنی‌داری را به ایستگاه‌ها در فصل نشان داد ( $p < 0.05$ ). آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در آستانه نسبت به سنگر و کیشهر نشان داد. میانگین غلظت نیکل در بهار (۵/۶۶±۱/۱۵)، تابستان (۴/۳۳±۰/۵۷)، پاییز (۳/۶۶±۰/۵۷) و زمستان (۵/۶۶±۲/۰۸) میلی‌گرم بر لیتر بود. آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در پاییز نسبت تابستان، بهار و زمستان نشان داد ( $p < 0.05$ ).


بود. آزمون میانگین با واریانس یک‌سویه اختلاف معنی‌داری را در طول کل سس‌ماهیان سر بزرگ در ایستگاه‌ها و فصل نشان داد ( $p < 0.05$ ). آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در طول کل سس‌ماهیان سر بزرگ کیشهر نسبت به آستانه و سنگر نشان داد. طول کل در بهار (۲۴/۷۵±۱/۵۴)، تابستان (۲۶/۷۲±۱/۶)، پاییز (۲۳/۷۷±۰/۹۹) و زمستان (۲۵/۵۲±۲/۷۹) سانتی‌متر بود. آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در بهار نسبت تابستان، پاییز و زمستان نشان داد ( $p < 0.05$ ). نتایج متوسط وزن کل آنها به تفکیک ایستگاه و فصل و میانگین کل یک‌ساله ایستگاه‌ها در شکل ۲ آورده شده است. میانگین وزن کل سس‌ماهی سر بزرگ در سنگر (۲۰۷/۹۴±۱۱/۹۲)، آستانه (۲۲۷/۹۸±۱۵/۶۰)، کیشهر (۱۸/۵۲±۲۳۰/۲۱) گرم در طول یک‌سال بود. آزمون میانگین با واریانس یک‌سویه اختلاف معنی‌داری را طول کل سس‌ماهی سر بزرگ در ایستگاه‌ها و فصل نشان داد ( $p < 0.05$ ). آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در وزن کل سس‌ماهیان سر بزرگ سنگر نسبت به آستانه و کیشهر نشان داد. طول کل در بهار (۲۱۹/۵۱±۲۴/۲۹)، تابستان (۲۴۵/۹۱±۲۱/۳۸)، پاییز (۲۱۱/۸۶±۱۱/۳۹) و زمستان (۲۱۴/۱۸±۲۱/۶۴) سانتی‌متر بود. آزمون توکی به‌صورت جفت به جفت اختلاف معنی‌داری را در زمستان نسبت تابستان، پاییز و بهار نشان داد ( $p < 0.05$ ). براساس نتایج به‌دست آمده در خصوص میزان غلظت فلز سنگین سرب در عضله سس‌ماهی سر بزرگ سفیدرود متوسط کل ماهیان مورد آزمایش مقدار  $0.0 \pm 58/1$  میکروگرم در هر گرم عضله




شکل ۱- طول کل سس ماهی سر بزرگ در ایستگاه و فصل‌های مختلف (حروف غیر مشترک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد).

جدول ۲- میانگین وزن کل (گرم) و طول کل (سانتی‌متر) سس‌ماهیان سر بزرگ رودخانه سفیدرود در سه گروه سنی


سن (سال)	تعداد	وزن کل (گرم)	طول کل (سانتی‌متر)
۱+	۲۰	۱۹۰±۸/۳۶	۱۸/۸۸±۱/۴۵
۲+	۱۶	۲۳۰/۵۳±۹/۰۳	۲۲/۱۵±۱/۲۸
۳+	۱۲	۲۶۹/۹۶±۱۳/۲۵	۲۳±۱/۶۰
میانگین کل	۴۸	۲۲۱/۷۲±۲۱/۸۲	۲۵/۱۹±۱/۹۷



شکل ۲- وزن کل سس ماهی سر بزرگ (گرم) در ایستگاه و فصل‌های مختلف (حروف غیر مشترک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد).



شکل ۳- غلظت فلز سنگین سرب در بافت عضله ماهی سس سر بزرگ (میلی‌گرم بر لیتر) در ایستگاه و فصل‌های مختلف (حروف غیر مشترک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد).



شکل ۴- غلظت فلز سنگین نیکل در بافت عضله ماهی سس سر بزرگ (میلی‌گرم بر لیتر) در ایستگاه و فصل‌های مختلف (حروف غیر مشترک نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار می‌باشد).

#### ۴ | بحث و نتیجه‌گیری

می‌شوند. بنابراین در تحقیقات مختلفی، غلظت فلزات سنگین در بافت ماهی‌های آب شیرین به‌طور قابل توجهی مطالعه شده‌اند ( Javed

فلزات سنگین نه تنها تهدیدی برای ماهی‌ها هستند، بلکه برای مصرف‌کنندگان ماهی آلوده به این فلزات نیز خطر بزرگی محسوب

2005; Chattopadhyay *et al.*, 2002; Papagiannis *et al.*, 2004). در رودخانه‌ها، ماهی‌ها اغلب در بالای زنجیره غذایی قرار دارند

و احتمال تجمع فلزات سنگین در آنها زیاد است (Mansour and Sidky, 2002). البته به دلیل تفاوت در غلظت فلزات، خصوصیات

شیمیایی آبی که ماهیان از آن نمونه برداری شده، نیازهای اکولوژیکی، متابولیسم و الگوهای تغذیه ماهی و همچنین فصلی که در آن مطالعات انجام شده بر روی میزان این تجمع مؤثر و از این نظر ماهیان شاخص مهم حضور فلزات سنگین در آب‌های شیرین محسوب می‌شوند (Tawari-Fufeyin and Ekaye, 2007; Karadede-Akin and Unlu, 2007). در ماهیان بافت عضله معمولاً دارای پایین‌ترین مقادیر غلظت فلزات سنگین می‌باشد (Al-Yousuf *et al.*, 2000) و عضله محل اصلی تجمع فلزات سنگین نمی‌باشد (Al-Yousuf *et al.*, 2000).

فلزات سنگین مورد مطالعه در این بررسی از جمله عناصر سمی بوده و اثرات سوئی را بر مصرف‌کنندگان بر جای می‌گذارند. بطوریکه سرب از نظر انتشار، گسترده‌ترین عنصر سنگین و سمی در محیط زیست بوده و به میزان زیاد در محیط‌های آبی یافت می‌شود. این فلز سنگین در صورت جذب از طریق غذا برای مصرف‌کنندگان بسیار سمی بوده و موجب اختلالات سیستم اعصاب و مشکلات رفتاری در آنها می‌شود (Ismaili *et al.*, 2002). بر این اساس استفاده از ماهی‌هایی که دارای غلظت‌های بالایی از تجمع فلزات سنگین در بافت‌های خود هستند ممکن است برای سلامتی مصرف‌کننده مضر باشد. سرب به‌عنوان یک نوروٹوکسین باعث کاهش رشد و بقا و نقص در رفتار جانوران می‌شود (Karadede *et al.*, 2007). هنگامی که سرب وارد بدن ماهیان می‌گردد گلبولهای قرمز خون آنها در بدن پخش و در کلیه‌ها و پوست تجمع می‌دهند. غلظت پایین تر فلزات سنگین در عضله عمدتاً به دلیل کمتر بودن مقادیر پروتئین‌های باند شونده با این فلزات می‌باشد (Allen-Gill and Martynov, 1995).

باتوجه به مقادیر به‌دست آمده از تجمع فلزات سنگین در گونه مورد بررسی در این مطالعه و مقایسه آنها با استانداردهای جهانی (جدول ۵) می‌تواند آگاهی بخش مصرف و مدیریت منابع آبی باشد. نتایج این تحقیق نشان داده است که میزان سرب در سس ماهی سر بزرگ سفیدرود ۵۸/۱ میکروگرم در هر گرم عضله بوده که تا حد زیادی محدود ایمن مصرف نشان می‌دهد. البته استانداردها برای این فلز مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد میزان سرب در عضله ماهی مورد مطالعه پایین تر از حد استاندارد است ولی از نظر سازمان جهانی بهداشت کمی از حد ایمن مصرف بالاتر است. نتایج بررسی‌های گذشته بر روی ماهیان مختلف همواره تجمع بالاتر سرب در کبد و آبشش نسبت به عضلات را نشان داده اند (Fazli *et al.* 2014; Askari Sari, *et al.* 2011; Velayatzadeh and Tabibzadeh; 2013).

مقایسه میزان تجمع سرب در عضله سس ماهی سر بزرگ با دیگر ماهیان مورد مطالعه در ایران در جدول ۴ آورده شده که نشان از مقادیر

متفاوت تجمع سرب در عضلات ماهیان ایران دارد که گونه، مکان، رژیم غذایی و دیگر عوامل فیزیولوژیک و اکولوژیک در این تفاوت‌ها مؤثر بوده‌اند. البته مطالعات گذشته نیز بر این مسأله تأکید دارند که ممکن است در برخی از ماهیان سرب در عضلات آنها قابل سنجش باشد ولی به دلیل پایین تر بودن میزان تجمع از حد استاندارد، مصرف آنها با رعایت مقادیر مصرف می‌تواند انجام گیرد. به‌عنوان مثال غلظت هیچ یک از فلزات کادمیوم، سرب و وانادیوم در بافت عضله ماهی یلی در حد خطرناک برای مصارف انسانی نیست (Tatina *et al.*, 2018). در ماهی شوریده در خلیج فارس نیز مقادیر سرب پایین تر از حد مجاز بوده است (Mortazawi, 1999). عضله ماهی میش‌ماهی (*Argyrosomus hololepidotus*) و ماهی سوکلا (*Rachycentron canadum*) دریای عمان (خلیج چابهار) میزان سرب در مقایسه با حد مجاز استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی بالاتر به‌دست آمد (Shahri and Velayatzadeh, 2017). در مورد گونه‌های حوضه جنوبی دریای خزر نیز معمولاً مقادیر سرب متفاوت بوده و برخی از گونه پایین و برخی بالای حد استاندارد را نشان داده‌اند (جدول ۴).

دومین فلزسنگین مورد بررسی در این مطالعه نیکل بوده که به‌طور گسترده در طبیعت وجود داشته تجمع آن می‌تواند موجب بیماری‌های متعدد را برای آبرزی و مصرف‌کننده‌ای آن به‌بار آورد. میزان نیکل عمدتاً در اتمسفر بیشتر از خاک است و از طریق رواناب‌ها و رودخانه‌ها وارد زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی می‌شود (Askarisari and Velayatzadeh, 2013). مقادیر غلظت نیکل در ماهیان بسیار متفاوت گزارش شده و به‌نظر می‌رسد محیط و رژیم غذایی در این تفاوت‌ها بیشترین نقش را داشته باشند. براساس مطالعات گذشته میزان نیکل در گونه‌های شکارچی و بنتوزخوار بیشتر سنجش شده است. میزان آن در گونه‌های کفشک زبان گاوی، زمین‌کن دم‌ناری، گل خورک و کفشک گرد بالاتر از گونه‌های سطح‌زی گزارش شده است. همچنین غلظت فلز سنگین نیکل در عضله میش‌ماهی و ماهی سوکلا که از گونه‌های پرمصرف منطقه چابهار می‌باشند نسبت به استاندارد-های جهانی بالاتر بود.

سازمان بهداشت جهانی قابل تحمل نیکل را ۳۸٪ مشخص کرده است (جدول ۵). مقادیر نیکل در عضلات سس‌ماهی سر بزرگ سفیدرود غلظت بسیار بالاتری نسبت به این استاندارد را نشان می‌دهد که این مسأله به آلودگی آب و کفزی بودن و کفزی خواری این ماهی می‌تواند مرتبط باشد. همان‌گونه که جدول ۴ نشان می‌دهد مطالعات ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر و آب‌های خلیج فارس مقادیر مختلفی را نشان داده‌اند ولی در حوضه جنوبی خزر کفال و ماهی سفید که از ماهیان کفزی می‌باشند

جدول ۴ - میزان فلزات سنگین سرب و نیکل در عضلات ماهیان مختلف ایران در مناطق مختلف و نتایج میزان این دو فلز در سس ماهی سفیدرود

گونه ماهی	محل نمونه برداری	سرب Pb	نیکل Ni	منبع
فیل ماهی	حوضه جنوبی دریای خزر	-	۰/۱۶±۰/۰۳	Mashroofeh <i>et al.</i> , 2012
ازون برون	//	-	۰/۱±۰/۰۴	//
کفال	حوضه جنوبی دریای خزر	۳/۰۱±۰/۰۵	۲/۴۹±۱/۰۲	Fazli <i>et al.</i> , 2014
یلی	خلیج فارس	۱/۱±۰/۰۴	۰/۳۶±۰/۰۳	Tatina <i>et al.</i> , 2018
کیلکا	حوضه جنوبی دریای خزر	۰/۱۱۳	-	Najm <i>et al.</i> , 2014
سه خاره	//	۰/۱۲۶	-	//
گطان	رودخانه کارون	۰/۲۲۷ ±۰/۱۴	۰/۱۶۹±۰/۰۱۳	Askary Sary, <i>et al.</i> , 2011
زمین کن دم نواری	بندرماهشهر	۱/۶۵/ ±۴ ۲۴	-	Sanjar <i>et al.</i> , 2010
کپور نقره ای	چاه نیمه های سیستان	۰/۰۹ ±۰/۰۱	۰/۲۴±	Pakzad Tochai, 2013
صبور	شمال غرب خلیج فارس	۱/۰۱۳±۰/۰۲۷	۴/۰۰۴±۲/۷۰۱	Sadouq Neiri <i>et al.</i> , 2010
گل آذین ماهی	حوضه جنوبی دریای خزر	-	۰/۷	Mirzajani <i>et al.</i> , 2017
شاه کولی	//	۰/۴۸	۰/۶۷	//
ماهی سفید	محمودآباد	۰/۲۴۹	-	Salehi Burbani <i>et al.</i> , 2015
کفال	//	۰/۳۵۹	-	//
کیلکا	//	۰/۲۷	-	//
کولی	سواحل گیلان	۱/۴۶	۰/۱۶	Ebadi Fathabad <i>et al.</i> , 2017
سفید	//	۴/۵۴	۰/۶۱	//
سوف	//	۳/۱۴	۰/۳۵	//
قزل الا	//	۲/۵۱	۰/۲۱	//
شیریت	اروندرو	۱۶/۴۲	۰/۷۷	Dadelahi, <i>et al.</i> , 2009
اردک ماهی	تالاب انزلی	۰/۲۲	-	Ebrahimi Sirizi <i>et al.</i> , 2011
کوتر چشم درشت	//	۰/۵۵	۰/۰۹	//
شوریده	خلیج فارس	۰/۹۸	-	Askari Sari and Velayatzadeh, 2013
قباد	//	۰/۳۹	-	//
شیر	//	۰/۷۱	-	//
آلوزا	جنوب شرقی دریای مازندران	-	۱/۱۸	Sadeghi Bajgiran <i>et al.</i> , 2014
سوف	//	-	۰/۹۲۸	//
شورت	سواحل استان هرمزگان	۰/۰۱۳	۰/۲۵	Kosaj <i>et al.</i> , 2019
شانک زرد باله	سواحل دیلم، شمال خلیج فارس	۶/۷۵	-	Hosseini <i>et al.</i> , 2016
اردک ماهی	تالاب انزلی	۰/۰۰۱	-	Sadrinejad <i>et al.</i> , 2020
سیاه ماهی	قنات های بیرجند	-	۰/۱۸	Mansouri <i>et al.</i> , 2022
ماهی بیه	رودخانه دز (استان خوزستان)	-	۰/۹۰۷	Beheshti <i>et al.</i> , 2012
ماهی لوتک	رودخانه کارون	۰/۲۲۲	-	Velayatzadeh and Tayebzadeh, 2013
سس ماهی	رودخانه سفیدرود	۰/۵۸	۴/۸۳	تحقیق حاضر

جدول ۵ - مقایسه غلظت فلزات سنگین در بافت عضله سس ماهی مورد مطالعه با استانداردهای جهانی (میلی‌گرم در کیلوگرم)

استانداردها	سرب	نیکل	منبع
WHO	۰/۵	۰/۳۸	Coulibaly <i>et al.</i> , 2012
FDA	۵	۰/۵	Nwani <i>et al.</i> , 2010
MAFF	۲	-	Coulibaly <i>et al.</i> , 2012
NHMRC	۱/۵	۱	Shahri <i>et al.</i> , 2017
FAO	۲	۰/۵	Pourang <i>et al.</i> , 2005
USEPA	۴	۱	Mishra <i>et al.</i> , 2007
سس ماهی سفیدرود	۰/۵۸	۴/۸۳	تحقیق حاضر

باتوجه به نتایج به‌دست آمده در این پژوهش میزان سرب پایین‌تر و میزان نیکل نسبت به تمامی استانداردهای معتبر جهانی (جدول ۵) بسیار بالاتر تعیین شده که مصرف عضلات این ماهی از نظر نیکل را بسیار خطرناک تعیین کرده است. باتوجه به این مسأله نظارت دقیق‌تر آب و منابع ورودی نیکل به این اکوسیستم نیازمند توجه ویژه می‌باشد.

#### پست الکترونیک نویسندگان

sharifi\_1350@yahoo.com حسینعلی شریفی ارده‌جانی:  
 mfarokhrooz@yahoo.com مسعود فرخ‌روز لاشیدانی:  
 rahimibashar@yahoo.com محمدرضا رحیمی بشر:  
 h.khara1974@yahoo.com حسین خارا:  
 ershad5353@gmail.com هادی ارشاد لنگرودی:

#### REFERENCES

Abdoli A., Naderi M. 2009. Biodiversity of fishes of the southern basin of the Caspian Sea: Iranian Fisheries Science Research Institute, 52-58. (In Persian).  
 AOAC (Association of Official Agricultural Chemists). 1995. Official methods of analysis of AOAC International, contaminants, drugs, 16th editon. AOAC International, Arlington, Virginia Vol. 1, Agriculture chemicals.  
 Askari Sari A., Velayatzadeh M., Beheshti M., Khodadadi M. 2011. Heavy metals accumulation of mercury, lead and cadmium in the tissues of *Liza abu* in Karun and Bahmanshir Rivers, Khuzestan province. Iranian Journal of Fisheries, 2: 140-131. (In Persian).  
 Askari Sari A., Velayatzadeh H. 2018. Measurement and comparison of lead and zinc heavy metal concentration in muscle and liver of three moon species. (In Persian).  
 Askary Sary A, Khodadadi M, Mohammadi M.2011. Concentration of heavy metal (Cd, Pb, Ni, Hg) in muscle, gill and liver tissues of *Barbus xanthopterus* in Karoon River . isfj 2011; 19 (4) :97-106.  
 Ashja A., Sohrabi M., Mirheidari S., Abdullah Begi H., 2008. investigation of the amount of mercury, lead, zinc and copper in the muscle tissue and liver of Haji Tarkhan perch (*Perca fluviatilis*) in Abkanar and Shijan areas of Anzali wetland in spring season , Marine Science and Technology Research, 4(2): 47 - 60 (In Persian).

Al-Yousuf M.H., El-Shahawi M.S., Al-Ghais S.M. 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of *Lethrinus lentjan* fish species in relation to body length and sex. Scinces of Total Environment, 256: 87-94.  
 Allen-Gill S.M., Martynov V.G. 1995. Heavy metals burdens in nine species of freshwater and anadromous fish from the Pechora River, Northern Russia. Science of the Total Environment, 160: 653-659  
 Alquezar R., Markich S.J., Booth D.J. 2006. Metal accumulation in the smooth toadfish, *Tetractenos glaber*, in estuaries around Sydney, Australian Environment Pollution, 142:123-131.  
 Beheshti M., Askari Sari A., Velayatzadeh M. 2012. Assessment of heavy metals concentration of fish (*Liza abu*) in Karoon River, Khuzestan province. Water and wastewater, 3: 125-33. (In Persian).  
 Begum A., Mustafa A.I., Amin M.N., Chowdhury T.R., Quraishi S.B., Banu N. 2013. Levels of heavy metals in tissues of shingi fish (*Heteropneustes fossilis*) from Buriganga River, Bangladesh. Environmental Monitoring and Assessment, 185: 5461-5469.  
 Canli M., Atli G. 2003. The relationships between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Environment Pollution 121: 129-136.  
 Chattopadhyay B., Chatterjee A., Mukhopadhyay S.K. 2002. Bioaccumulation of metals in the East Calcutta wetland ecosystem. Aquatic Ecosystem Health and Management, 5(2): 191-203.  
 Chen Y.C. and Chen M.H., 2001. Heavy metal concentrations in nine species of fishes caught in coastal waters off Ann-Ping, S.W. Taiwan. Journal of Food and Drug Analysis, 9:107-114.  
 Coad B.W.2014 Freshwater fishes of Iran. A checklist and bibliography. Ichthyology Section. Canadian Museum of Nature. Ottawa, Ontario 1992; Canada. 66p.  
 Copat C., Arena G., Fiore M., Ledda C., Fallico R., Sciacca S., Ferrante M. 2013. Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: consumption advisories. Food Chemical Toxicology, 53: 33-37.  
 Coulibaly S., Celestin Atse B., Mathias Koffi K., Sylla S., Justin Konan K., Joel Kouassi N. 2012. Seasonal Accumulations of Some Heavy Metal in Water, Sediment and Tissues of BlackChinned Tilapia *Sarotherodon melanotheron* from Bietri Bay in Ebrie

- Lagoon, Ivory Coast. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 88: 571-576.
- Dadelahi, A., Nabavi, M., & Kheivar, N. (2009). The relationships between biometric characteristics of *Barbus grypus* with heavy metals levels in tissues of the river's self-purification capacity, 4th Environmental Engineering Conference and Exhibition, Tehran, 10: 2-9 (In Persian).
- Ebrahimi Sirizi Z., Sakizadeh M., Esmaili Sari A., Bahramifar N., Qasim Puri S., Abbasi K. 2011. Investigating the heavy metals cadmium, lead, copper and zinc in the muscle tissue of duck fish of Anzali International Wetland, accumulation and risk assessment. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (University Letter), 22(87): 57-63 (In Persian).
- Ebadi Fathabad A., Tajik H., Shariatifar N. 2017. Measuring the concentration of heavy metals and assessing the risk caused by them in different fish species. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (University Letter), 28(168): 118-132 (In Persian).
- Fazeli, M.S., Abtahi, B., & SabbaghKASHANI, A. (2005). Assessing Pb, Ni and Zn accumulation in the tissues of *Liza aurata* in the south Caspian Sea. IRANIAN SCIENTIFIC FISHERIES JOURNAL, 14(1), 65-78.
- Griboff J., Wunderlin D.A., Monferran M.V. 2017. Metals, as and Se determination by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in edible fish collected from three eutrophic reservoirs. Their consumption represents a risk for human health? Microchemical Journal, 130: 236-244.
- Hosseini A., Saneti A., Mohammad, T., Moghadam H., Namjoo F., Khodadad A. 2016. Bioaccumulation of heavy metals lead, zinc and copper in the muscle and liver of yellowfin shank fish (*Acanthopagrus latus* (Houttuyn, 1782) in the coastal waters of Dilam, North of the Persian Gulf. Scientific Research Journal of Applied Fisheries Research, 4(1):57- 43 (In Persian).
- Ismaili Sari A. 2002. Pollutants, Environmental Health and Standards, Naqsh Mehr Publications, Tehran, 767p (In Persian).
- Javed M. 2005. Heavy metal contamination of freshwater fish and bed sediments in the river Ravi stretch and related tributaries. Pakistan Journal of Biological Sciences, 8(10): 1337-1341.
- Jahangiri M., Mohammadi Gh., Velayatzadeh M. 2016. Measurement of nickel in the muscle of Sokla fish (*Rachycentron Canadum*) in different length groups in fishing in northwestern waters of the Persian Gulf, New Technologies in Aquaculture Development (Fisheries), 11(3): 47-58. (In Persian).
- Jia Y., Wang L., Qu Z., Wang C., Yang Z. 2017. Effects on heavy metal accumulation in freshwater fishes: species, tissues, and sizes. Environmental Science and Pollution Research, 24: 9379-9386.
- Karadede H., Oymak S.A., Ünlü E. 2004. Heavy metals in mullet, *Liza abu*, and catfish, *Silurus triostegus*, from the atatürk dam lake (Euphrates), Turkey. Environment International, 30: 183-188.
- Kazanchiev E.N. 1981. Fishes of Casipan Sea. Moscow, Lectures of Fisheries, pp: 124-143.
- Karadede-Akin H., Unlu E. 2007. Heavy metal concentrations in water, sediments, fish and some benthic organisms from Tigris River, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 131: 323-337.
- Koosej, N., & Kamrani, E. (2012). Determination and Measurement of Cadmium Concentration in Muscle of *Periophthalmus Waltoni* in Persian Gulf Region. Journal of Fisheries, 64(4), 333-343. Iqbal Shamsabad P., Mimariani M., Moatar F. 2010. Investigating the heavy elements of chromium, cadmium, lead and organic materials in Sefidroud with a perspective on their structural earth origin. The scientific-specialized magazine of the lagoon - Islamic Azad University Ahvaz branch, 2(3): 39-55 (In Persian).
- Mashroofeh A, Alireza Riyahi Bakhtiari A, Pourkazemi M. 2012. Evaluation of Cadmium, Vanadium, Nickel and Zink Concentrations in Different Tissues of Beluga and Stellate Sturgeon and Risk Assessment Regarding Consuming Their Muscle Tissue in South Caspian Sea. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 22 (96) :89-96.
- Mansouri S.A., Sidky M.M. 2002. Ecotoxicological studies. 3: Heavy metals contaminating water and fish from Fayoum Governorate, Egypt. Food Chemistry, 78: 15-22.
- Marvtdost Anarkoli M., Haeripour S., Amirnjad R. 2015. Investigating the water quality of Sefidroud River in the area of Rudbar. Wetland ecobiology (wetland). 7(25): 33-42 (In Persian).
- Masoumi, H., Habibi, A., & Ghodrati, A. (2021). Morphology and effective processes on Sefidroud flow changes to predict horizon 2030. Journal of Geography and Environmental Hazards, 10(1), 81-97.
- Merciai R., Guasch H., Kumar A., Sabater S., García-Berthou E. 2014. Trace metal concentration and fish size: variation among fish species in a Mediterranean and river. Ecotoxicology and Environmental Safety, 107: 154-161.

- human beings in Thane Creek area, Mumbai. *Chemosphere*, 69(6), 972-978.
- Mirzajani, A., Hamidian, A. H., & Karami, M. (2017). Investigation of metals in organisms from different trophic levels of the southwest Caspian. *Journal of Natural Environment*, 70(2), 467-479.
- Mortazawi M.S. 1999. Heavy metals concentrations in *Otolithes ruber* and *Pampus argenteus* location from the Gulf. *Qatar University Science Journal*, 19: 165-171.
- Najm M., Shokrzadeh M., Fakhar M., Sharif M., Hosseini S.M., RahimiEsboei B., Habibi F. 2014. Concentration of heavy metals (Cd, Cr and Pb) in the tissues of *Clupeonella cultriventris* and *Gasterosteus aculeatus* from Babolsar coastal waters of Mazandaran Province, Caspian Sea. *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences*, 24(113): 185-192. (In Persian).
- Nwani, C. D., Lakra, W. S., Nagpure, N. S., Kumar, R., Kushwaha, B., & Srivastava, S. K. (2010). Toxicity of the herbicide atrazine: effects on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in the freshwater fish *Channa punctatus* (Bloch). *International journal of environmental research and public health*, 7(8), 3298-3312.
- Papagiannis I., Kagalou I., Leonardos J., Petridis D., Kalfakaou V. 2004. Copper and zinc in four freshwater fish species from Lake Pamvotis (Greece). *Environment International*, 30: 357-362.
- Pakzad Tochaei S. 2013. Investigating the pattern of accumulation of heavy metals (Ni, Pb, Cu, and Zn) in muscle, liver, kidney, gill and scales of silver carp (*Hipophthalmichthys molitrix*) in the half of Sistan. *Scientific Research Journal of Oceanography*, 4(13): 21-28 (In Persian).
- Pourang, N., Nikouyan, A., & Dennis, J. H. (2005). Trace element concentrations in fish, surficial sediments and water from northern part of the Persian Gulf. *Environmental monitoring and assessment*, 109, 293-316.
- Rajeshkumar S., Li X. 2018. Bioaccumulation of heavy metals in fish species from the meiliang bay, taihu lake, China. *Toxicology Reports*, 5: 288-295.
- Rajkowska M., Protasowicki M. 2013. Distribution of metals (Fe, Mn, Zn, Cu) in fish tissues in two lakes of different trophy in Northwestern Poland. *Environmental Monitoring and Assessment*, 185: 3493-3502.
- Rumiani L., Velayatzadeh M., Mashayikhi F. 2015. Evaluation of the risk of heavy metals mercury, cadmium, lead and arsenic in two species of (*Tor grypys*) and (*Capoeta capoeta*) in Helle Bushehr river, developmental biology, 8(4): 45 -58. (In Persian).
- Sadough Niri, A., Nikpour, Y., Rajabzadeh, E., Mahboobi Soofiani, N.A., & Ahmadi, R. (2010). Assessment heavy metals (Cd, Pb, Cu, CO, Ni) in some tissues of *Tenulosa ilisha* from northwest Persian Gulf and their relationship with length and weight. *JOURNAL OF AQUATIC SCIENCES*, 1(1), 73-87
- Saha N., Mollah M.Z.I., Alam M.F., Rahman M.S. 2016. Seasonal investigation of heavy metals in marine fishes captured from the Bay of Bengal and the implications for human health risk assessment. *Food Control*, 70, 110-118.
- Sanjar, F., Javaheri, M., & Askari sari, A.(2010). Measurement and comparison of heavy metals ( Pb,Cd) in muscle and skin in Bartail flathead (*Platycephalus indicus*) from Mahshar fishing area. *JOURNAL OF MARINE BIOLOGY*, 1(4), 35-46.
- Sarker A., Kim J.E., Islam A.R.M., Bilal M., Rakib M., Jahan R., Islam T. 2021. Heavy metals contamination and associated health risks in food webs—a review focuses on food safety and environmental sustainability in Bangladesh. *Environmental Science and Pollution Research*, 14:1-16.
- Shahri E., Velayatzadeh. 2017. Accumulation of nickel, cadmium and lead in the muscle of the ewe fish (*Argyrosomus hololepidotus*) and Sokla fish (*Rachycentron canadum*) in the sea of Oman (Chabahar Gulf), *Marine Biology*, 10(37): 7 - 86
- Shahri Khorasani N., Nouri Gh., Kordmostafipour F., Velayatzadeh M. 2016. Examination and comparison of heavy metal concentrations (nickel, lead, cadmium and zinc) in the muscle of seared, halva black, lion and koter fish in Chabahar region. *Food hygiene, summer*, 7(2):41- 55. (In Persian).
- Sadeghi Bajgiran S., Pourkhabaz A., Hasanpour M., Sinkakarimi M. 2014. Investigating the metals zinc, nickel and vanadium in the muscle of alosa (*Alosa caspia*) and perch (*Sander lucioperca*) and evaluating the non-carcinogenic risk caused by its consumption in the southeast of Mazandaran Sea. (In Persian).
- Salehi Borban S., Karachorlu M., Zamani F. 2015. Investigating the amount of heavy metals in the muscle and oil of white fish, common kilka and narrow-nosed mullet. *Food hygiene*, 6(4): 75-87. (In Persian).
- Sadrinejad A., Golestan L., Khara H., Ghorbani Hassansaraei A., Ahmadnejad M. 2020. Health assessment of heavy metals (lead, zinc, cadmium and copper) in muscle, liver, gonad, intestine and digestive parasites of duck fish (*Esox lucius*) of Anzali lagoon. *Scientific research journal of applied ichthyology researches*; 9 (3): 41-50. (In Persian).
- Sharghi A., Abdoli A., Rahmani H., Shahraki M., Nazari H. 2011. Environmental Effects of Shahid Rajai's Dam on Aquatic Fauna. *Journal of Oceanography*, 2(5): 21-27. (In Persian).
- Shajiei H., Vosoughi G.H., Oryan S., Ramin M. 2002. Biological characteristics of growth and reproduction in *Barbus capito* in south coasts of the Caspian Sea-Gilan Province. *Iranian Journal of Marine Sciences and Techniques*, 1(4): 85-98. (In Persian).
- Squadrone S., Prearo M., Brizio P., Gavinelli S., Pellegrino M., Scanzio T., Guarise S., Benedetto A., Abete M.C. 2013. Heavy metals distribution in

- muscle, liver, kidney and gill of European catfish (*Silurus glanis*) from Italian Rivers. *Chemosphere*, 90: 358-365.
- Subotic S., Spasic S., Visnjic-Jeftic Z., Hegedis A., Krpocetkovic J., Mickovic B., Skoric S., Lenhardt M. 2013. Heavy metal and trace element bioaccumulation in target tissues of four edible fish species from the Danube River (Serbia). *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 98: 196-202.
- Tawari-Fufeyin P., Ekaye S.A. 2007. Fish species diversity as indicator of pollution in Ikpoba River, Benin City, Nigeria. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 17: 21-30.
- Tatina M., Arian Sh., Gharibkhani M. 2018. Investigating the accumulation of heavy metals (nickel, lead, cadmium and vanadium) due to the effect of oil pollution in the muscle tissue of *Pelates quidrileneatus* of the Persian Gulf, *Marine Biology*, 1(3): 28- 39. (In Persian).
- Velayatzadeh M., Askari Sari A., Khodadadi M., Kazemian M., Mahbobeh Beheshti M. 2013. Measurement and comparison of the concentration of heavy metals mercury, lead and cadmium in the tissues of *Liza abu* rivers. Karun and Dez of Khuzestan province. *Environmental science and technology*, 3(16): 51-61. (In Persian).
- Varol M., Sünbül M.R. 2019. Environmental contaminants in fish species from a large dam reservoir and their potential risks to human health. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 169: 507–515.
- Varol M., Sünbül M.R. 2020. Macroelements and toxic trace elements in muscle and liver of fish species from the largest three reservoirs in Turkey and human risk assessment based on the worst-case scenarios. *Environmental Research*, 184L 109-298.
- Varol M., Kurt-Kaya G., Sünbül M.R. 2019. Evaluation of health risks from exposure to arsenic and heavy metals through consumption of ten fish species. *Environmental Science and Pollution Research*, 26: 33311-33320.
- Weber P., Behr E.R., Knorr C.D.L., Vendruscolo D.S., Flores E.M.M., Dressler D.L., Baldisserotto B. 2013. Metals in the water, sediment, and tissues of two fish species from different trophic levels in a subtropical Brazilian river. *Microchemical Journal*, 106: 61-66.
- Yi Y.J., Zhang S.H. 2012. The relationships between fish heavy metal concentrations and fish size in the upper and middle reach of Yangtze River. *Procedia Environmental Sciences*, 13: 1699-1707.

## نحوه استناد به این مقاله:

شریفی ارده‌جانی ح.، لاشیدانی م.، رحیمی بشر م.ر.، خارا ح.، لنگرودی ه. ۱۴۰۱. میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب و نیکل) در بافت عضله سس‌ماهی سر بزرگ (*Luciobarbus capito*) در رودخانه سفیدرود (استان گیلان). نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی، (۴) ۱۰: ۳۶-۴۷.  
<https://doi.org/10.22034/jair.10.4.5>

Sharifi H., Lashidani M., Rahimi M.R., Khara H., Langroudi H. 2023. Bioaccumulation of heavy metals (lead and nickel) in muscle tissue *Luciobarbus capito* in Sefidroud river. *Journal of Applied Ichthyological Research*, 10(4): 36-47. <https://doi.org/10.22034/jair.10.4.5>

## Bioaccumulation of heavy metals (lead and nickel) in muscle tissue *Luciobarbus capito* in Sefidroud river (Giulan provence)

Sharifi ardejani H<sup>1</sup>, Farraokh Rooz Lashidani M<sup>2\*</sup>, Rahimi Bashar M.R<sup>2</sup>, Khara H<sup>3</sup>, Ershad Langroudi H<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Student, Dept. of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

<sup>2</sup> Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

<sup>3</sup> Assistant Prof., Dept. of Marine Biology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

<sup>4</sup> Associate Prof., Dept. of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

### Type:

Original Research Paper

<https://doi.org/10.22034/jair.10.4.5>

### Paper History:

Received: 11-10-2022

Accepted: 14-12- 2022

### Corresponding author:

Lashidani M. Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran.

Email: [mfarokhrooz@yahoo.com](mailto:mfarokhrooz@yahoo.com)

### Abstract

The largest river in the southern basin of the Caspian Sea, Sefidroud, and the most important native fish of it is *Luciobarbus capito*. Due to its long route and passing through different areas, this river is subject to the entry of various contaminants including heavy metals. The aim of this research was to investigate the amount of bioaccumulation of lead and nickel heavy metals in the muscle tissue of fish sauce in Sefidroud River. For this purpose, three stations along the route were selected and in the four seasons of 1400, 45 fish sauces were caught from these areas by throwing nets. The samples were transferred to the laboratory under standard conditions and after biometry, samples were taken from their muscles and the amount of these metals was determined by chemical digestion method and with the help of atomic absorption device. The results showed that the fishes caught in Sefidroud River in different seasons and stations were in the age range of +1 - +3 and the total weight was  $221.72 \pm 21.82$  grams and the total length was  $25.19 \pm 1.97$  cm. The concentration of lead heavy metal in the muscle of Sefidroud bighead fish sauce showed  $0.58 \pm 0.1$  micrograms per gram of muscle and showed a significant difference in the stations in the seasons ( $P < 0.05$ ). The average one-year nickel concentration in muscles was  $4.1 \pm 83.4$  micrograms per gram of muscle. According to these results, the concentration of lead is low and according to the standards of the World Health Organization and other valid standards, the consumption indicates the permissible amount, but the amount of nickel in the muscles of the Sefidroud bighead fish sauce is high and even exceeds the safe consumption values of some indicators.

**Keywords:** Sefidroud River, *Luciobarbus capito*, heavy metals, lead, nickel.