



تعیین بهترین دوز تزریق هورمون اوایلین در تکثیر مصنوعی ماهی ماده کپوردریایی (*Cyprinus carpio*) با بررسی برخی از فاکتورهای خونی و هورمون‌های استروئیدی

مجید محمدنژاد

دانشیار، گروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی بهترین دوز هورمون اوایلین در تکثیر مصنوعی ماهی مولد ماده کپوردریایی در بهار سال ۱۴۰۰ در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال در بندرترکمن استان گلستان انجام پذیرفت. تعداد ۱۲ قطعه ماهی ماده بالغ کپوردریایی با وزن متوسط $1750/46 \pm 312/58$ گرم تحت تزریق دوزهای ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ و ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن هورمون اوایلین قرار گرفتند. نمونه‌گیری از خون ماهیان در دو مرحله صورت پذیرفت. مرحله اول قبل از تزریق و مرحله دوم ۱۲-۱۰ ساعت بعد از تزریق بود. نتایج بررسی شاخص‌های خون‌شناسی نشان داد که تزریق دوزهای مختلف هورمون اوایلین بر تعداد گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، هموگلوبین، MCV، MCH و MCHC هیچ تأثیری ندارد ($p > 0.05$). اما باعث کاهش میزان هماتوکریت و گرانولوسیت و افزایش مونوسیت می‌گردد ($p < 0.05$). در نتایج بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی نیز میزان گلوکز و کورتیزول در تمامی تیمارها افزایش و میزان تری‌گلیسرید، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، کلسیم، پتاسیم و سدیم در تمامی تیمارها کاهش یافته بود ($p < 0.05$). همچنین نتایج بررسی هورمون‌های استروئیدی نشان داد که با تزریق دوزهای مختلف هورمون اوایلین میزان هورمون‌های تستوسترون، استرادیول و پروژسترون در تمامی تیمارها افزایش یافت ($p < 0.05$). نتایج این بررسی نشان داد که دوزهای ۰/۶ و ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بهترین تأثیر را بر شاخص‌های خونی و هورمون‌های استروئیدی مورد مطالعه در کپوردریایی ماده داشتند اما پیشنهاد می‌گردد برای حداکثر بازدهی و صرفه اقتصادی از دوز ۰/۶ میلی‌لیتر بر کیلوگرم برای تکثیر مولدین کپور استفاده گردد.

واژه‌های کلیدی:

مولد ماده، ماهی کپوردریایی، هورمون اوایلین، خون‌شناسی، هورمون‌های جنسی

نوع مقاله:

پژوهشی اصیل

<https://doi.org/10.22034/jair.10.2.41>

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۰۰/۰۶/۲۶

پذیرش: ۰۰/۱۱/۳۰

نویسنده مسئول مکاتبه:

مجید محمدنژاد، دانشیار، گروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

ایمیل: m_mohammadnejad2013@yahoo.com

۱ | مقدمه

برای مقابله با چالش کم شدن جمعیت برخی ماهیان باارزش، توسعه روش‌هایی برای القای تولیدمثل در ماهیان است. تکنیک‌ها این امکان را داده است تا گونه‌هایی را که به‌طور طبیعی در شرایط اسارت تولیدمثل نمی‌کنند، تکثیر کرده و بچه‌ماهی تولید کرد (Gabriel et al., 2016). در برخی از ماهی‌ها می‌توان با دستکاری در دوره نوری و دمای آب، شرایط تخم‌ریزی را فراهم نمود. اما در بسیاری از ماهیان پرورشی پیشرفت در هر مرحله از تولیدمثل نیازمند القاء هورمون از خارج از بدن ماهی است. در برخی ماهی‌ها هم این دستکاری‌های هورمونی فقط به‌عنوان ابزار مدیریتی برای افزایش تولید تخم در کارگاه‌ها انجام می‌شود. با دست‌یافتن به یافته‌های علمی در دهه‌های اخیر دانش شناخت غدد درون‌ریز با تغییرات اساسی وارد مرحله نوینی شده است به‌طوری که امروزه برای کنترل تولیدمثل و توسعه روند تکثیر و پرورش آبزیان علم شناخت غدد درون‌ریز ماهیان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار

عوامل محیطی تعیین‌کننده فصل تولیدمثل در ماهیان می‌باشند. خصوصیات محیطی مکان‌های تخم‌ریزی باعث القاء بلوغ نهایی تخمک‌ها، اوولاسیون و تخم‌ریزی می‌شود. ترکیب فصل مطلوب و محیط مطلوب تخم‌ریزی، احتمالاً باعث ایجاد بهترین شرایط جهت بقای لاروها و بچه‌ماهیان می‌شود. کنترل محیطی گامتوزن هم سبب اثرات بلندمدت جهت تکمیل گامتوزن و هم اثرات سریع بر مراحل اسپرمیشن، اوولاسیون و تخم‌ریزی می‌شود. پرورش ماهی در شرایط مصنوعی آنها را از دستیابی به شرایط مطلوب فوق جهت تولیدمثل محروم می‌کند. شرایط پرورشی دلیل اصلی عدم اوولاسیون و تخم‌ریزی در مولدین ماده پرورشی می‌باشد. با دستکاری محیط مولدین، می‌توان هم زمان تخم‌ریزی را تنظیم نمود و هم در تمام طول سال تولید تخم و اوولاسیون و تخم‌ریزی را القا نمود (Beirao et al., 2019). از جمله مهم‌ترین پیشرفت‌ها در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان

مورد بررسی قرار گرفته نشده است و غالب تحقیقات در خارج از کشور در ارتباط با گربه ماهی صورت پذیرفته است (Ukwe and Abu, 2016; Maradun et al., 2018; Mamndeyati et al., 2018; Maradun et al., 2019; Ayoola et al., 2011). در حال حاضر نیز هورمون اولین در ایران براساس پیشنهاد شرکت سازنده به میزان ۰/۵ میلی‌لیتر به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ماهی کپور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی‌که دوز پیشنهادی شرکت سازنده باتوجه به وضعیت فیزیولوژی و تولیدمثل در گونه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد، لذا در این تحقیق اثرات دوزهای مختلف هورمون اولین بر برخی از فاکتورهای خونی و هورمون‌های جنسی مولدین ماده کپور دریایی مورد بررسی قرار گرفت.

۲ | مواد و روش‌ها

بررسی حاضر در بهار سال ۱۴۰۰ بر روی مولدین ماده ماهی کپوردریایی در مرکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی سیجوال در بندرترکمن استان گلستان انجام پذیرفت. مولدین صید شده از سواحل شرقی دریای خزر پس از انتقال به مرکز تکثیر ابتدا به منظور کاهش استرس ناشی از دستکاری و حمل و نقل و نیز سازگار شدن با شرایط جدید به مدت دو هفته در داخل ونیرو نگهداری شدند. شرایط فیزیوشیمیایی آب محل نگهداری ماهیان برای دمای آب $20/5 \pm 1$ درجه سانتی‌گراد، میانگین pH برابر $7/9 \pm 0/21$ ، اکسیژن در حد اشباع و برابر $7/5 \pm 0/42$ میلی‌گرم در لیتر بود. پس از طی مراحل سازگاری و برای انجام شروع آزمایش‌ها ابتدا ماهیان با پودر گل‌میخک به میزان ۲۰۰ میلی‌لیتر در لیتر بیهوش گردیده و سپس زیست‌سنجی ماهیان انجام گردید که میانگین طول، وزن کل و سن آنها به ترتیب برابر $51/32 \pm 3/65$ سانتی‌متر، $1750/46 \pm 312/58$ گرم و $3/92 \pm 0/43$ بود. کار صید و سازگاری کپور ماهیان دریایی در اواخر فروردین ماه صورت پذیرفت. سپس عملیات تزریق با دوزهای مختلف هورمون اولین انجام شد. مولدین ماده در ۴ گروه و تعداد ۳ عدد مولد با دوزهای ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ و ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن هورمون اولین در زیر باله سینه‌ای مورد تزریق قرار گرفتند. تزریق ماهیان ماده به صورت دو مرحله‌ای و در مرحله اول ۱۰ درصد و در مرحله دوم ۹۰ درصد هورمون مورد استفاده قرار گرفت. فاصله بین تزریق اول و دوم برابر با ۱۰ الی ۱۲ ساعت در نظر گرفته شد. تعداد ماهیان مورد بررسی در هر تیمار ۳ عدد مولد ماده بود. برای بررسی میزان شاخص‌های خون‌شناسی، بیوشیمیایی و برخی از هورمون‌های جنسی خون‌گیری به‌وسیله سرنگ‌های مخصوص ۵ سی‌سی و از ناحیه دمی در دو مرحله قبل از تزریق اول و ۱۰ الی ۱۲ ساعت بعد از تزریق دوم انجام پذیرفت. در هر بار خون‌گیری ابتدا ماهیان با پودر گل‌میخک به میزان ۲۰۰ میلی‌لیتر در لیتر بیهوش گردیدند (Mohammad Nejad, 2017). پس از عملیات خون‌گیری نمونه‌های خون در لوله‌های آزمایشگاهی جمع‌آوری و جهت بررسی شاخص‌های خون‌شناسی به آزمایشگاه خون‌شناسی ارسال گردیدند. به‌منظور بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی سرم خون جداسازی سرم نمونه‌ها در دستگاه سانتریفیوژ با

شده و کنترل هورمونی به‌عنوان یک ابزار کارآمد در جهت تکثیر و پرورش آبیان به کار می‌رود (Khodadost et al., 2015). در ماهیان استخوانی رشد و رسیدگی تخمک‌ها شامل مراحل مختلفی است که این مراحل تحت کنترل هورمون‌های مختلفی نظیر هورمون‌های گنادوتروپین، پروژسترون، تستوسترون و استرادیول می‌باشند (Mosh, 2018). دستکاری هورمونی در تولیدمثل ماهیان بر استفاده از هورمون لوتئینی LH استوار است که مستقیماً در سطح گناد عمل می‌کند یا بر آگونیست‌های سنتتیک هورمون رهاکننده گنادوتروپین GnRHa، که در سطح هیپوفیز برای القاء ذخایر اندوژن LH عمل می‌کند. موارد استفاده از هورمون‌های مصنوعی و غیرمصنوعی در ماهیان مختلف گزارش شده است و تزریق هورمون برای تحریک تخم‌ریزی در گونه‌های زیادی از ماهیان در آبی‌پروری انجام می‌گردد (Ballestrazzi and Rainis, 2005; Zohar and Mylonas, 2001). برای دستیابی به شاخص‌های تولیدمثلی مطلوب، نیاز به بهره‌گیری از یک القاء‌کننده مؤثر در تخم‌ریزی با دوز مناسب تزریقی است؛ چرا که در رسیدگی جنسی مولدین اثر مطلوبی ایجاد می‌کنند. در حال حاضر آنالوگ هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRHa) بهترین روش بیوتکنولوژی موجود به‌منظور القای تکثیر و تولیدمثل در ماهیان است. این هورمون‌های مصنوعی شامل اوپریم (Ovaprim)، اوآتید (Ovatide)، اواریپرایم (Ovaryprim)، اولین (Ovulin)، اوپل (Ovopel) و اوپین-ال (Ovupin-L) می‌باشند (Müller et al., 2018). هورمون اولین (Ovulin hormone) یکی از هورمون‌هایی است که برای القاء رسیدگی نهایی، اوولاسیون و تکثیر مصنوعی ماهیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین یک عامل القاکننده ساختگی جدید است که به‌لحاظ تجاری عرضه شده و به شکل آماده توسط شرکت داروسازی Ningbo Sansheng چین تولید می‌شود. این هورمون حاوی آنالوگ Domperidone و S-GnRH است و طبق توصیه شرکت سازنده مقدار ۰/۵ میلی‌لیتر به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن آن در ماهی ماده و نصف این مقدار در ماهی نر تزریق می‌شود (Maradun et al., 2018).

ماهی کپور دریایی (*Cyprinus carpio*) از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) است که در دریای خزر زیست می‌کند و یکی از با ارزشترین گونه‌های آبی اقتصادی دریای خزر است. این گونه جزو گونه‌های شاخص و منحصر به فرد دریای خزر به‌شمار می‌رود که به دلیل صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه‌ها و مناطق تخم‌ریزی، در معرض خطر انقراض قرار گرفته و بقای نسل این گونه دچار تهدید جدی گردیده است. در حال حاضر مراکز بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی استان گلستان نسبت به تکثیر مصنوعی ماهی کپوردریایی اقدام نموده و بچه‌ماهیان تولیدشده را جهت حفظ ذخایر به دریا رهاسازی می‌نمایند. براساس بررسی صورت گرفته و اعلان کارشناسان تکثیر اداره کل شیلات استان گلستان در طی سالیان گذشته هورمون‌های متفاوتی از جمله هیپوفیز، اوپریم، اواریم و اولین در این مراکز برای تکثیر ماهی کپوردریایی مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون اثرات مربوط به هورمون اولین بر عملکرد تولیدمثلی ماهی کپوردریایی به‌صورت دقیق

نتایج بررسی شاخص‌های خون‌شناسی (جدول ۱) نشان‌داد که تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین بر تعداد گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، هموگلوبین، MCV، MCH، و MCHC هیچ تأثیری ندارد ($p > 0.05$). هرچند میزان هموگلوبین در تمامی دوزها حالت کاهشی داشته است اما تغییرات معنی‌دار نبوده است. ضمن اینکه میزان هماتوکریت و گرانولوسیت در دوزهای مختلف کاهش داشته و مونوسیت افزایش یافته است ($p < 0.05$). نتایج بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون مولدین ماده کپوردریایی در جدول ۲ نشان داد که تمامی فاکتورهای مورد مطالعه در اثر تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین دچار تغییر شده‌اند. براساس این نتایج میزان گلوکز و کورتیزول در تمامی تیمارها افزایش و میزان تری‌گلیسرید، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، کلسیم، پتاسیم و سدیم در تمامی تیمارها کاهش یافته است ($p < 0.05$). همچنین نتایج بررسی هورمون‌های استروئیدی در جدول ۳ نیز نشان داد که با تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین میزان هورمون‌های تستوسترون، استرادیول و پروژسترون در تمامی تیمارها دچار افزایش شده است ($p < 0.05$).

۵۰۰۰ دور در مدت ۵ دقیقه، انجام و سپس مقادیر فاکتورهای گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، توتال پروتئین، آلبومین، کلسیم، سدیم، پتاسیم، کورتیزول و هورمون‌های استروئیدی استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به‌وسیله دستگاه‌های آزمایشگاهی مخصوص تعیین گردید (Mohammad Nejad, 2017; Shirmohammadli and Mohammad Nejad, 2021). نتایج داده‌های آزمایشگاه در نهایت جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-26 و Excel-2010 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به‌منظور بررسی توزیع نرمال داده‌ها در گروه‌ها و تکرارها جهت تشکیل تیمارها از آزمون Shapiro-Wilk استفاده شد. در صورت نرمال بودن داده‌ها به‌منظور مقایسه آماری بین گروه‌ها در تیمارها از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (OneWay ANOVA) و پس از انجام آزمون Test of Homogeneity of Variances جهت مقایسه گروه‌ها با یکدیگر از آزمون دانکن استفاده شد.

۳ | نتایج

جدول ۱- نتایج تغییرات برخی از شاخص‌های خون‌شناسی مولدین ماده ماهی کپوردریایی تحت تأثیر تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین

فاکتورهای خون‌شناسی / تیمار (میلی‌لیتر بر کیلوگرم)	۰/۴		۰/۵		۰/۶		۰/۷	
	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق
RBC ($10^7/\mu\text{l}$)	۱۱۹/۹۵ ± ۲/۳۳	۱۲۱/۶ ± ۲/۹۷	۱۱۴/۱ ± ۰/۲۸	۱۱۶/۳ ± ۰/۱۴	۱۱۹/۳ ± ۱/۲۷	۱۲۰/۷ ± ۱/۲۷	۱۱۵/۳۵ ± ۰/۰۷	۱۱۸/۱ ± ۰/۰۰
Hb (g/dl)	۱۳/۱۴ ± ۱/۶۹	۱۱/۸ ± ۱/۹۷	۱۲/۸۵ ± ۱/۰۶	۱۱/۷ ± ۱/۴۱	۱۲/۱ ± ۰/۸۴	۱۱/۱ ± ۱/۱۳	۱۲/۶ ± ۰/۲۸	۱۰/۹ ± ۰/۵۶
Hct (%)	۲۸/۰۵ ± ۰/۷۷ ^b	۲۳/۸۵ ± ۲/۱۲	۳۳/۶۵ ± ۰/۷۷ ^a	۲۷/۰۵ ± ۱/۰۶	۲۹/۵۵ ± ۰/۴۹ ^b	۲۵/۹ ± ۰/۷	۳۵/۹۵ ± ۱/۹ ^a	۲۷/۱ ± ۳/۲۵
MCV (fm)	۱۶۱/۳۵ ± ۸/۰۸	۱۶۰ ± ۴/۸	۱۵۹/۳ ± ۲/۶۸	۱۶۰/۸۵ ± ۲/۱۹	۱۴۹/۳۵ ± ۵/۰۲	۱۵۴/۴۵ ± ۴/۴۵	۱۶۸/۴ ± ۴/۸	۱۷۰/۱۲۵ ± ۲/۷۵
(pg) MCH	۷۳/۰۵ ± ۱/۹۰	۷۳/۰۷ ± ۰/۶۳	۷۰/۹۵ ± ۲/۰۵	۷۰/۸۵ ± ۳/۰۴	۶۷/۳ ± ۲/۸۲	۶۷/۷۵ ± ۰/۶۲	۷۲/۵۵ ± ۲/۴۹	۷۱/۷ ± ۱/۶۹
MCHC (g/dl)	۴۴/۹۵ ± ۰/۷۷	۴۴/۴ ± ۲/۶۸	۴۴/۷ ± ۲/۱۲	۴۴/۹۵ ± ۰/۳۱	۴۳/۵۵ ± ۳/۱۱	۴۳/۳ ± ۱/۵۵	۴۲ ± ۱/۲۷	۴۲/۸ ± ۰/۷
WBC ($10^7/\mu\text{l}$)	۱۷/۲ ± ۰/۱۴	۱۷/۰۲ ± ۰/۳۵	۱۷/۱۲ ± ۰/۲۳	۱۷/۱۵ ± ۰/۱۴	۱۷/۱۱ ± ۰/۰۲	۱۷/۰۱ ± ۰/۲۹	۱۶/۵ ± ۰/۱۴	۱۶/۹ ± ۰/۲۸
مونوسیت (درصد)	۶۶/۷ ± ۱/۵۵ ^b	۷۴ ± ۰/۷ ^a	۶۳/۳ ± ۱/۴۱ ^c	۶۸/۶ ± ۱/۲۷ ^b	۷۰/۹۵ ± ۰/۴۷ ^a	۷۵/۹۵ ± ۱/۰۶ ^a	۵۶/۷۵ ± ۰/۷۷ ^d	۶۹/۹ ± ۴/۸ ^b
گرانولوسیت (درصد)	۳۳/۳ ± ۱/۵۵ ^c	۲۶ ± ۰/۷ ^b	۳۶/۷ ± ۱/۴۱ ^b	۳۱/۴ ± ۱/۰۶ ^b	۲۹/۰۵ ± ۰/۹۷ ^d	۲۴/۰۵ ± ۱/۵۵ ^b	۴۳/۲۵ ± ۰/۶۳ ^a	۳۰/۱ ± ۱/۱۳ ^a

حروف لاتین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده اختلاف بین ماهیان است ($p < 0.05$).

جدول ۲- نتایج تغییرات برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی سرم مولدین ماده ماهی کپوردریایی تحت تأثیر تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین

فاکتورهای بیوشیمیایی / تیمار (میلی‌لیتر بر کیلوگرم)	۰/۴		۰/۵		۰/۶		۰/۷	
	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق
گلوکز (mg/dl)	۱۲۳ ± ۴/۲۴	۲۶۲ ± ۹/۸۹ ^a	۱۱۳/۵ ± ۱۷/۶۷	۲۰۷ ± ۵۲/۳۲ ^{ab}	۹۶/۵ ± ۴/۲۴	۱۷۶ ± ۱۵/۵۵ ^b	۱۲۵/۵ ± ۴/۹۴	۲۳۹/۵۹ ± ۹/۱۹ ^{ab}
تری‌گلیسرید (mg/dl)	۹۶/۵ ± ۱/۴۱ ^d	۹۲ ± ۲/۸۲ ^c	۱۶۴/۵ ± ۴/۹۴ ^b	۱۵۴/۵ ± ۳/۵۲ ^b	۲۲۷/۵ ± ۳/۵۸ ^a	۱۸۴ ± ۸/۴۸ ^a	۱۲۸ ± ۵/۶۵ ^c	۱۰۵ ± ۴/۹۴ ^c
کلسترول (mg/dl)	۲۳۶/۵ ± ۴/۹۴ ^a	۲۰۳ ± ۲/۸۲ ^a	۱۸۹/۵ ± ۷/۷۷ ^b	۱۴۷/۵ ± ۳/۵۳ ^c	۱۵۴/۵ ± ۰/۷ ^c	۱۲۰ ± ۱/۴۱ ^d	۲۳۷ ± ۱۱/۳۱ ^a	۱۶۵ ± ۸/۴۸ ^b
پروتئین کل (mg/dl)	۴/۰۵ ± ۰/۰۶ ^a	۳/۷۵ ± ۰/۰۵ ^a	۴/۰۵ ± ۰/۰۷ ^a	۳/۷ ± ۰ ^a	۲/۵۵ ± ۰/۰۴ ^b	۳/۱ ± ۰ ^c	۳/۵۵ ± ۰/۰۷ ^b	۳/۴۵ ± ۰/۰۶ ^b
آلبومین (g/dl)	۱/۸۱ ± ۰/۰۲ ^b	۱/۶۴ ± ۰/۰۱ ^a	۲/۲ ± ۰/۰۷ ^a	۱/۶ ± ۰/۰۲ ^{ab}	۱/۵۲ ± ۰/۰۲ ^c	۱/۳۳ ± ۰/۰۰ ^c	۱/۸۴ ± ۰/۰۷ ^b	۱/۵۶ ± ۰/۰۳ ^b
کلسیم (mg/dl)	۲۵/۰۴ ± ۴ ^a	۲۲/۵۵ ± ۴/۲۸ ^a	۲۰/۷۴ ± ۰/۸۶ ^{ab}	۱۹/۰۵ ± ۰/۵۵ ^{ab}	۱۲/۸۵ ± ۰/۶۹ ^c	۱۱/۵۲ ± ۰/۵۹ ^b	۱۵/۰۶ ± ۰/۹۳ ^{bc}	۱۲/۳۲ ± ۱/۴۴ ^b
سدیم (MEQ/L)	۱۵۳/۵ ± ۲/۱۲ ^a	۱۴۲ ± ۱/۴۱ ^a	۱۴۲ ± ۱/۴۲ ^c	۱۲۹ ± ۱/۴۴ ^c	۱۴۶/۵ ± ۲/۱۲ ^{bc}	۱۳۶/۵ ± ۰/۷ ^b	۱۵۱ ± ۱/۴۶ ^{ab}	۱۳۷ ± ۲/۸۲ ^b
پتاسیم (MEQ/L)	۰/۵ ± ۰ ^b	۰/۴ ± ۰ ^a	۰/۹۵ ± ۰/۰۷ ^a	۰/۳ ± ۰ ^b	۰/۵۵ ± ۰/۰۶ ^b	۰/۲ ± ۰ ^c	۰/۵ ± ۰ ^b	۰/۲ ± ۰ ^c
کورتیزول (μg/dl)	۱۹/۸۵ ± ۰/۶۳ ^c	۳۹/۷ ± ۱/۶۹ ^b	۲۳/۲ ± ۱/۵۵ ^{ab}	۱۶۸ ± ۱۶/۹۷ ^a	۲۸/۲۵ ± ۱/۲۴ ^a	۵۷/۱۵ ± ۱/۲۰ ^b	۲۴/۰۵ ± ۱/۲۰ ^b	۴۱ ± ۱/۲۷ ^b

حروف لاتین غیرمشترک در هر ردیف، نشان دهنده اختلاف بین ماهیان است ($p < 0.05$).

جدول ۳- نتایج تغییرات برخی از هورمون‌های استروئیدی مولدین ماده ماهی کپوردریایی تحت تأثیر تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین

فاکتورهای بیوشیمیایی / تیمار (میلی‌لیتر بر کیلوگرم) (ng/dl)	۰/۴		۰/۵		۰/۶		۰/۷	
	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق	قبل تزریق	بعد تزریق
تستوسترون	۲۱۶۵ ± ۵۴۴۴	۴۲۵ ± ۶۲۱۲۰	۱۲۲ ± ۲۹/۶۹	۷۰۶ ± ۱۹/۰۹ ^a	۲۲۱/۵ ± ۱۸/۵	۶۹۱ ± ۱۴/۱۴ ^a	۲۲۶ ± ۲۲/۹۴	۵۲۷/۵ ± ۲۴/۶۴ ^b
استرادیول (pg/ml)	۵۶۹ ± ۵۰/۹۱ ^a	۱۷۴۰ ± ۲۰۱/۲۲۰	۲۴۹/۵ ± ۲۶/۰۲ ^b	۴۰۲۰ ± ۲۶۸/۷۰ ^b	۲۵۲/۱ ± ۴۲/۶۹ ^b	۴۲۴۹ ± ۲۲۵/۸۷ ^b	۵۹۲ ± ۵۲/۲۲ ^a	۶۰۲۲ ± ۸۵۱/۲۵ ^a
پروژسترون (ng/ml)	۰/۱۶۵ ± ۰/۰۴ ^b	۰/۲۶۵ ± ۰/۰۶ ^c	۰/۲۳۵ ± ۰/۰۳ ^a	۱/۱۸ ± ۰/۰۴ ^b	۰/۲۴ ± ۰/۰۱ ^a	۱/۲۶ ± ۰/۰۳ ^b	۰/۲۶ ± ۰/۰۴ ^{ab}	۲/۱۶ ± ۰/۰۷ ^a

حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف، نشان دهنده اختلاف بین ماهیان است ($p < 0.05$).

۴ | بحث و نتیجه‌گیری

مهاجرت که در اکثر ماهیان مورد مطالعه و نیز بررسی حاضر ثابت شده است و تأثیر مستقیم کورتیزول بر سرکوب سیستم ایمنی ماهیان به‌نظر می‌رسد که اندازه‌گیری شاخص‌های ایمنی در ماهی کپوردریایی می‌تواند به فهم بیشتر این موضوع کمک نماید که متأسفانه در تحقیق حاضر ایمنی اندازه‌گیری نشده است اما در مطالعات آتی می‌تواند توسط سایر محققین مورد لحاظ قرار گیرد.

امروزه با پیشرفت آنالیز فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون، درک بهتری از وضعیت فیزیولوژیک و سلامتی آبیان به‌دست آمده است. فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ثابت نیستند به‌طوری‌که تحقیقات مختلف نشان‌داد که برخی از این فاکتورها با توجه به سن، جنس، زمان تولیدمثل و تنش‌های محیطی تغییر پیدا می‌کنند (Nikoo et al., 2013; Firouzbakhsh et al., 2010). نتایج بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون مولدین ماده کپوردریایی در بررسی حاضر نشان داد میزان گلوکز و کورتیزول در تمامی تیمارها افزایش و میزان تری‌گلیسرید، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، کلسیم، پتاسیم و سدیم در تمامی تیمارها کاهش یافته است ($p < 0.05$). کلسترول و تری‌گلیسرید به‌عنوان دو ترکیب مهم در طی تکامل گناد و بیوسنتز استروئیدهای

جنسی نقش دارند (Herme et al., 2002; Zadmajid and Vaziry, 2016). در تحقیق جاری نیز با تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین مقدار کلسترول و تری‌گلیسرید سرم خون در تمامی دوزهای مورد مطالعه کاهش یافت به‌طوری‌که بیشترین کاهش تری‌گلیسرید در دوز ۰/۶ و کمترین میزان کاهش در دوز ۰/۴ و بیشترین کاهش کلسترول مربوط به دوز ۰/۷ و کمترین کاهش در دوز ۰/۴ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بود. از طرفی میزان هر سه هورمون استروئیدی که کلسترول و تری‌گلیسرید در سنتز آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند در دوزهای مختلف افزایش می‌یابد که با بررسی مجدد جداول ۲ و ۳ مشخص می‌گردد که یک رابطه معکوس بین مقدار هورمون‌های استروئیدی با میزان کلسترول و تری‌گلیسرید وجود دارد. گلوکز خون متغیرترین پارامتری است که به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر استرس، دستکاری و حمل، استرس محیطی، تغییرات فصلی و وضعیت تغذیه‌ای و بلوغ می‌باشد (Hosseinifard et al., 2013). اکثر مطالعات افزایش گلوکز در اثر تزریق هورمون را نشان داده‌اند به‌طوری‌که تزریق هورمون هیپوفیز بر ماهی ماده کپورسرگنده باعث افزایش گلوکز گردید (Heydari et al., 2014) که با نتایج بررسی جاری هم‌خوانی دارد.

ثابت شده است که شاخص‌های خونی ماهیان تحت تأثیر حالات مختلف تغذیه‌ای، بیولوژی و فیزیولوژی می‌تواند دستخوش تغییر گردد (Mohammad Nejad, 2017; Mohammad Nejad et al., 2018; Shirmohammadli et al., 2020; Shirmohammadli and Mohammad Nejad, 2021). نتایج بررسی حاضر نشان‌داد که تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین بر تعداد گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، هموگلوبین، MCV، MCH، MCHC هیچ تأثیری نداشت ($p > 0.05$) اما باعث کاهش میزان هماتوکریت و گرانولوسیت و افزایش مونوسیت گردید ($p < 0.05$). در خصوص اثرات هورمون‌تراپی در سایر ماهیان نیز تزریق هورمون هیپوفیز در مولدین ماده ماهی کپورسرگنده باعث افزایش میزان هماتوکریت، تعداد گلبول‌های قرمز و مونوسیت و کاهش تعداد گلبول‌های سفید، MCHC، MCH و لنفوسیت گردید (Heydari et al., 2014). که به‌جز کاهش لنفوسیت با نتایج تحقیق حاضر مطابقت نداشت. تزریق هورمون ۱۷ بتااسترادیول در ماهی اوزون برون جوان باعث کاهش گلبول‌های قرمز خون، هموگلوبین، هماتوکریت و MCH گردید (Khara et al., 2014) که به‌جز کاهش هماتوکریت با نتایج تحقیق حاضر مطابقت نداشت. در خصوص افزایش مونوسیت به‌نظر می‌رسد تزریق هورمون روی شاخص‌های ایمنی ماهی تأثیرگذار باشد. از طرفی به‌دلیل افزایش میزان کورتیزول در زمان تخم‌ریزی و افزایش گلوکز می‌تواند مربوط به فعالیت‌های تولیدمثلی و نیاز به انرژی ماهی و متعاقب آن آزاد شدن گلیکوژن کبد در خون باشد (Rafati et al., 2016). تزریق هورمون گنادوتروپین جفت انسان (HCG) باعث افزایش سطح گلوکز سرم خون مولدین ماده ماهی قرمز گردید که نشان‌دهنده بروز استرس در مولدین در نتیجه تزریق هورمون است (Zadmajid and Vaziry, 2016) که با نتایج بررسی حاضر هم‌خوانی دارد. تزریق هورمون گنادوتروپین جفت انسان (HCG) باعث افزایش گلوکز و نیز کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید سرم خون مولدین ماده ماهی قرمز گردید که با نتایج تحقیق جاری مطابقت دارد ضمن اینکه افزایش سطح گلوکز نشان‌دهنده بروز استرس در مولدین در نتیجه تزریق هورمون اعلان گردید (Zadmajid and Vaziry, 2016) که با نتایج تحقیق حاضر هم‌سو می‌باشد به‌طوری‌که در تحقیق حاضر نیز میزان گلوکز در تمامی دوزهای مورد مطالعه افزایش یافت که نشان‌دهنده بروز استرس در ماهیان مورد بررسی در نتیجه تزریق هورمون بوده است که بیشترین افزایش گلوکز در دوز ۰/۴ و کمترین افزایش دوز ۰/۶ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بود که نشان‌دهنده استرس کمتر دوز ۰/۶ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بر مولدین ماده ماهی کپوردریایی بوده

هورمون‌های استروئیدی استرادیول و تستوسترون با رشد تخمدان ارتباط نزدیک دارد. در کپور ماده وحشی میزان استرادیول در طی سال بین ۳۰ تا ۲۴۷ پیکوگرم بر میلی‌لیتر بوده است که بانایج تحقیق جاری از لحاظ مقدار هورمون نزدیک بود. میزان تستوسترون بین ۰/۰۵ تا ۰/۷۲ نانوگرم بر میلی‌لیتر و میزان پروژسترون بین ۰/۴۲ تا ۰/۷۱ نانوگرم بر میلی‌لیتر بوده است (Taghizadeh et al., 2013)، که از لحاظ مقدار با نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد. با شروع تخم‌ریزی، میزان استرادیول پلازما افزایش یافته و در تمام مدت بالا است (Taghizadeh et al., 2013)، که در تحقیق حاضر نیز میزان استرادیول پس از تزریق هورمون اولین در تمامی دوزها افزایش یافت. بر طبق نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که بیشترین میزان استرادیول سرم خون مولدین جنس ماده کپوردریایی پس از تزریق در دوز ۰/۷ افزایش معنی‌داری نسبت به سایر دوزها داشته است و کمترین میزان استرادیول در دوز ۰/۴ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بود. پروژسترون‌ها مسئول بلوغ نهایی تخمک نابالغ در جنس ماده اکثر ماهیان هستند (Imanpour and Zadmajid, 2010). محققین اثبات نموده‌اند که در مراحل نهایی رسیدگی اووسیت، غلظت پروژسترون افزایش می‌یابد (Hoga et al., 2018). در تحقیق حاضر نتایج میانگین غلظت پروژسترون خون در مولدین ماده ماهی کپوردریایی در دوز ۰/۷ افزایش معنی‌داری نسبت به سایر دوزهای مورد مطالعه داشت. در تحقیقی میزان پروژسترون پس از تزریق هورمون هیپوفیز در ماهی کپور معمولی (Kime and Dolben, 1985) و در بررسی دیگر در زمان تخم‌ریزی ماهی کپوردریایی به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (Yeganeh et al., 2019) که با نتایج بررسی حاضر هم‌خوانی دارد. آلونسو و همکاران (Guedes-Alonso et al., 2017) در مطالعه چرخه تولیدمثلی و استروئیدهای جنسی ماهی ماده کپور معمولی دریافتند که میزان تستوسترون و ۱۷ بتا استرادیول، هنگام استراحت جنسی پایین بوده و زمان تخم‌ریزی در حد بالا باقی ماند که بیانگر وجود فعالیت زرده سازی بوده است. همچنین براساس نتایج تقی‌زاده و همکاران (Taghizadeh et al., 2013) بالاترین سطح تستوسترون و پروژسترون ماهی کپوردریایی در فصل تابستان مشاهده شده است که این افزایش در پلازما می‌تواند با افزایش دمای آب که در فصل تابستان اتفاق می‌افتد، مرتبط باشد. به‌نظر می‌رسد دما نشانه مهمی است که باعث می‌شود تستوسترون به اوج خود برسد و منجر به بلوغ غدد جنسی و متعاقباً گامت آنها شود و به تولیدمثل برسد (Taghizadeh et al., 2013)، که باتوجه به اینکه دمای تزریق هورمون اولین در این تحقیق ۲۲ درجه سانتی‌گراد بود شاید افزایش میزان تستوسترون و پروژسترون در دوزهای مورد مطالعه به دمای آب بستگی داشته که نیازمند بررسی‌های بیشتر در خصوص تأثیر دماهای مختلف بر عملکرد این هورمون بر میزان تغییرات هورمون‌های تستوسترون و پروژسترون در مطالعات آتی می‌باشد.

استفاده از هورمون‌های سنتتیک در تکثیر آبزیان روزبه‌روز در حال افزایش است و جایگزین هورمون هیپوفیز گردیده و نتایج مثبتی داشته

است. کورتیزول در ماهیان استخوانی بر عملکرد تولیدمثل و رشد گامت اثر می‌گذارد (Yeganeh et al., 2019). مطالعات زیادی مؤید افزایش سطح پلاسمایی هورمون کورتیزول همزمان با مهاجرت تولیدمثلی در ماهیان استخوانی است (Yeganeh et al., 2019) در تحقیق جاری نیز مقدار کورتیزول در تمامی دوزهای مورد مطالعه پس از تزریق هورمون افزایش یافته است که بیشترین افزایش کورتیزول در دوز ۰/۵ و کمترین در تیمار ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بود. افزایش کورتیزول در زمان تخم‌ریزی ماهی کلمه، ممکن است در ارتباط با فعالیت‌های فیزیولوژیک ماهی مانند تنظیم اسمزی و فرآیندهای تأمین انرژی که همزمان با مهاجرت تولیدمثلی در ماهی رخ می‌دهد، باشد (Suzuki et al., 2000). افزایش غلظت پلاسمایی هورمون کورتیزول در ماهی کلمه ماده (*Rutilus rutilus caspicus*)، با نزدیک شدن به زمان تخم‌ریزی به زمان مهاجرت تولیدمثلی و تنش وارده به ماهی نسبت داده شد (Akhondian et al., 2015). افزایش میزان کورتیزول و گلوکز در اثر تزریق هورمون گنادوتروپین انسانی (HCG) و عصاره هیپوفیز کپور بر ماهی سوف سفید (*S. lucioperca*) (Falahatkar et al., 2010) و تزریق اوپریم و HCG در مولدین ماده کپور علفخوار (*Ctenopharyngodon idellus*) (Metwally and Fouad, 2008) اعلان گردید که با نتایج بررسی حاضر هم‌خوانی دارد.

تأثیر هورمون‌های گنادوتروپینی بر فرآیند گامت‌زایی و تولیدمثل در ماهیان استخوانی از طریق هورمون‌های استروئیدی صورت می‌گیرد (Barannikova et al., 2002). استروژن‌های محیطی توان القاء کردن اثرات مختلف روی عملکرد تولیدمثل در آبزیان را دارند (Linhart et al., 2020). در ماهیان، استروژن‌ها عهده‌دار رشد و رسیدگی نهایی تخمک‌ها می‌باشند. ثابت شده است برخی از تغییرات بیوشیمیایی و بیولوژیکی که در رسیدگی جنسی ماهی طی زرده سازی در طبیعت اتفاق می‌افتد می‌تواند با مدیریت استروژن در ماده‌های نابالغ بهتر از نرها القا شود (Hoga et al., 2018). سطوح هورمون‌های تولید مثلی خون معمولاً به‌عنوان علائم مناسبی برای شاخص‌های بیوشیمیایی ناشی از عملکرد سیستم تولیدمثلی در مواردی نظیر تزریق هورمون‌های سنتتیک در ماهیان می‌باشد (Hu et al., 2020). سلامت و همکاران (Salamat et al., 2009) گزارش نمودند که افزودن غلظت کم (۵۰ میکرولیتر در میلی‌لیتر) از ترشح هیپوفیز باعث افزایش ترشح هورمون‌های استروئیدی (استرادیول و پروژسترون) در فولیکول‌های تخمدان گردید. در تعدادی از ماهیان آب شیرین مانند ماهی آزاد، گربه‌ماهی و کپور معمولی ارتباط بین تغییرات سطوح پلاسمایی استروئیدهای گنادی و رشد اووسیت‌ها به‌خوبی ثابت شده است (Lee and Yang, 2002). نتایج بررسی حاضر نشان‌داد با تزریق دوزهای مختلف هورمون اولین میزان هورمون‌های تستوسترون، استرادیول و پروژسترون در تمامی تیمارها دچار افزایش شده است ($p < 0.05$). تقی‌زاده و همکاران (Taghizadeh et al., 2013) هورمون‌های استروئیدی کپوردریایی ماده را در حوزه جنوبشرقی دریای خزر در طی یکسال مطالعه کردند. نتایج مطالعه آنها نشان‌داد که تغییرات در سطح

تولید نمودند. به‌طور کلی این محققین اینگونه نتیجه‌گیری کردند که هورمون اولین نسبت به اوپریم از لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر است (Ukwe and Abu, 2016). برخلاف این نتایج، عبدالرحیم و همکاران (Abdulraheem et al., 2012) افزایش نرخ لقاح تخم‌ها را در تیمارهای هورمون اوپریم گزارش نمودند. این اختلاف در نتایج به‌دست آمده توسط محققین مختلف را می‌توان به تفاوت در فیزیولوژی ماهی و برخی تفاوت‌های محیطی نسبت داد. همچنین این تفاوت‌ها را می‌توان به فیزیولوژی محیط و برخی متغیرهای محیطی مانند دما، اکسیژن محلول و pH که تولیدمثل و رشد ماهی را کنترل می‌کنند، نسبت داد (Gabriel et al., 2016).

تعیین دوز مناسب تزریق هورمون‌های مصنوعی برای تکثیر ماهیان بسیار مهم می‌باشد و باید باتوجه به نوع هورمون مورد استفاده برای هر ماهی به‌صورت اختصاصی تعیین گردد. هرچند اکثر شرکت‌های سازنده دوز مناسب را برای تزریق اعلان کرده‌اند اما باتوجه به تفاوت‌های فیزیولوژی ماهیان مختلف و نیز تغییرات شرایط فیزیوشیمیایی آب از جمله دما تعیین دوز مناسب برای هر گونه ماهی امری الزامی به‌نظر می‌رسد. طبق توصیه شرکت سازنده هورمون اولین (شرکت داروسازی Ningbo Sansheng) مقدار دوز پیشنهادی ۰/۵ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ماهی ماده و نصف این مقدار در ماهی نر می‌باشد (Maradun et al., 2018). ماندیتی و همکاران (Mamndeyati et al., 2018) دوزهای ۰/۱، ۰/۳ و ۰/۵ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن هورمون اولین بر شاخص‌های تولیدمثلی گربه ماهی آفریقایی (C. *gariepinus*) را بررسی و اعلان نمودند که بالاترین هم‌آوری، بالاترین وزن تخم‌های لقاح‌یافته و بالاترین درصد تخم‌های چشم‌زده در گروه ۰/۵ میلی‌لیتر بوده است. اما بالاترین درصد تخم‌های لقاح‌یافته و بالاترین درصد تفریح در تیمار ۰/۱ میلی‌لیتر بوده است. همچنین بالاترین درصد بازماندگی را تیمار ۰/۳ میلی‌لیتر بود. نتایج آنها نشان داد که میزان ۰/۱ و ۰/۳ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن هورمون اولین تأثیر مثبتی بر گربه‌ماهی داشته است که این مقادیر از میزان دوز پیشنهادی توسط شرکت سازنده که ۰/۵ میلی‌لیتر بود پایین‌تر بوده است. اثر دوزهای مختلف هورمون اوولین (۰/۳، ۰/۵ و ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن) بر عملکرد تکثیر گربه ماهی آفریقایی توسط Maradun و همکاران در سال ۲۰۱۸ مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آنها نشان داد که گروه ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم دارای بالاترین درصد لقاح و بالاترین درصد تفریح است. اما پایین‌ترین درصد بازماندگی لارو را نسبت به تیمار ۰/۳ و ۰/۵ میلی‌لیتر داشت. همچنین تیمار ۰/۵ میلی‌لیتر بالاترین درصد بازماندگی لارو را داشت. این محققین پیشنهاد دادند که گربه ماهی آفریقایی را می‌توان با ۰/۳ میلی‌لیتر هورمون اولین مورد تکثیر مصنوعی قرار داد که پایین‌تر از دوز پیشنهادی شرکت سازنده آن (شرکت داروسازی Ningbo Sansheng) یعنی ۰/۵ میلی‌لیتر است (Maradun et al., 2018). در این تحقیق نیز باتوجه به نتایج شاخص‌های خونی و هورمون‌های استروئیدی مورد مطالعه دوزهای ۰/۶ و ۰/۷ تأثیرگذاری بهتری را نسبت به دوزهای ۰/۴ و ۰/۵ در مولدین ماده کپوردربایی داشتند. براساس نتایج تحقیق حاضر

است (Ibrahim et al., 2019). محققین مختلف تأثیرگذاری بهتر سایر هورمون‌ها را نسبت به هورمون هیپوفیز گزارش نموده‌اند. هورمون‌های مورد استفاده برای تکثیر مصنوعی ماهیان شامل عصاره هیپوفیز، اوپریم، اولین و ... به‌تنهایی و یا به‌صورت ترکیبی می‌باشند. محققین گزارش نمودند که هورمون‌های مصنوعی (مانند اولین) به‌طور موفقیت‌آمیزی سبب القای تخم‌ریزی در ماهیان می‌گردند (Maradun et al., 2018). که در تحقیق حاضر نیز مشخص گردید هورمون اولین دارای اثرات مثبتی بر شاخص‌های خونی و هورمون‌های استروئیدی ماهی ماده کپور دریایی می‌باشد. در سایر تحقیقات ایکن‌ویف و همکاران (Ikenweibe et al., 2010) گزارش نمودند که در گربه‌ماهی آفریقایی *C. gariepinus* بیشترین درصد لقاح در تیمار تزریق شده با هورمون اولین در مقایسه با ماهیان تزریق شده با هورمون هیپوفیز مشاهده شد. آیولا و همکاران (Ayoola et al., 2012) به بررسی تأثیر هورمون اولین و هورمون عصاره غده هیپوفیز بر عملکرد تولیدمثل گربه ماهی آفریقایی پرداختند که در همه پارامترهای بررسی شده اولین عملکرد بسیار بهتری داشت که با نتایج تحقیق جاری همسو می‌باشد چرا که استفاده از هورمون اولین باعث تأثیر بر هورمون‌های استروئیدی ماهی کپور ماده گردید. مقایسه اثربخشی و مقرون به‌صرفه‌بودن هورمون‌های اولین و اوپریم در تولید گربه‌ماهی آفریقایی نشان داد که اولین در تمام پارامترهای بررسی شده به‌جز در میزان زنده ماندن عملکرد بهتری داشت (Ukwe and Abu, 2016). این مطالعه نشان داد که اولین نسبت به اوپریم از لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه‌تر است (Ukwe and Abu, 2016)، ضمن اینکه هر یک از این هورمون‌های القاکننده تخم‌ریزی مزیت خود را دارند و استفاده از هر یک از آنها به انتخاب، هزینه، در دسترس بودن و اولویت پرورش‌دهندگان ماهی بستگی دارد (Ukwe and Abu, 2016). موشا (Mosh, 2018) در یک بررسی مروری ۲۰ مقاله را در خصوص استفاده از هورمون‌های مختلف بر کارایی تکثیر گربه‌ماهی آفریقایی مورد بررسی قرار داد. در میان مقالات بررسی شده، بالاترین درصد لقاح، تفریح و بازماندگی لارو گربه ماهی آفریقایی در ۰/۴-۰/۵ میلی‌لیتر در کیلوگرم اوپریم در مقایسه با اوواتید، اولین و عصاره غده هیپوفیز به‌دست آمد. مطالعه‌ای در مورد تأثیر استفاده از هورمون‌های مختلف (هیپوفیز خشک، هیپوفیز تازه و هورمون مصنوعی) بر عملکرد تولیدمثل گربه‌ماهی آفریقایی نشان داد عصاره هیپوفیز خشک عملکرد رشد بهتری نسبت به عصاره هیپوفیز تازه و هورمون مصنوعی (اولین) دارد (Ibrahim et al., 2019). بنابراین عصاره خشک هیپوفیز برای تکثیر گربه ماهی آفریقایی توصیه گردید که این امر نشان‌دهنده آن است که باید کارایی هر هورمون به صورت جداگانه بر تولیدمثل ماهیان و در شرایط مختلف تکثیر بررسی گردد. آکوی و آبو (Ukwe and Abu, 2016) گزارش کردند که دوره تأخیر (Latency period) در ماهیان تیمار شده با اولین کمتر از تیمار اوپریم بود به‌طوری‌که با افزایش غلظت هورمون (در هر دو گروه اولین و اوپریم)، دوره تأخیر کاهش یافت. همچنین نتایج این محققین نشان داد که مولدینی که تحت هورمون اولین قرار گرفته بودند، لاروهای با میانگین وزن بیشتری نسبت به مولدین تیمار شده با هورمون اوپریم

- gariiepinus*). African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 12(6): 6809-6822.
- Barannikova I.A., Dyublin V.P., Bayunova L.V., Semenkova T.B. 2002. Steroids in the control of reproductive function in fish. *euroscience and Behavioral Physiology*, 32: 141-148.
- Beirao J., Boulais M., Gallego V., O'Brien J.K., Peixoto S., Robeck T., Cabrita E. 2019. Sperm handling in aquatic animals for artificial reproduction. *Theriogenology*, 133: 161-178.
- Falihatkar B., Poursaeid S., Efatpanah I., Meknatkhab B., Ershad Langroudi H. 2010. Effects of hormonal treatment on induced spermiation, ovulation and steroids changes in Eurasian pikeperch *Sander lucioperca*. *Aquaculture Europe*, October 5-8, Porto, Portugal.
- Firouzbakhsh F., Abedi Z., Rahmani H., Khalesi M.K. 2013. A comparative study of some blood factors in male and female Caspian kutum (*Rutilus frisii kutum*) broodstock from the southern basin of the Caspian Sea. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 37: 320-325.
- Gabriel U.U., Akinrotimi O.A., Momoh Y. 2016. Comparison of some fish sorting tool for grading *Clarias gariepinus* fingerlings. *Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research*, 2: 109-118
- Guedes-Alonso R., Sosa-Ferrera Z., Santana-Rodríguez J.J. 2017. Determination of steroid hormones in fish tissues by microwaveassisted extraction coupled to ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry. *Food Chemistry*, 237: 1012-1020.
- Gullemin R. 1978. Peptides in brain: the new endocrinology of neuron. *Science*, 202:390-402.
- Hemre G.I., Taranger G.L., Hansen T. 2002. Gonadal development influences nutrient utilisation in cod (*Gadus morhua*). *Aquaculture*, 214: 201-209.
- Heydari I., Khara H., Vahabzadeh H. 2014. Effect of sex and hormone therapy on some blood cellular and biochemical Factors in bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*). *Journal of Renewable Natural Resources Research*, 4(4): 15-24. (In Persian).
- Hoga C.A., Almeida F., Reyes F. 2018. A review on the use of hormones in fish farming: Analytical methods to determine their residues. *Journal of Food*, 16(1): 679-691.
- Hosseinifard S.M., Ghobadi Sh., Khodabakhsh E., Razeghi Mansour, M. 2013. The effect of different levels of soybean meals and avizyme enzyme supplement on hematological and biochemical parameters of serum in rainbow trout. *Iranian Veterinary Journal*, 9(3): 43-53. (In Persian).
- Ibrahim J.Z., Ovie S.O., Maradun H.F., Asuwaju F.P., Mohammed Y.S., Sahabi A.M., Umar F. 2019. Breeding Response of *Clarias gariepinus* Induced with Pituitary Gland and Synthetic Hormone (Ovulin) and the Effect on Growth Performance of Its Hybrid in New Bussa, Nigeria. *Asian Journal of*
- استفاده از دوز ۰/۶ میلی‌لیتر بر کیلوگرم هورمون اولین در مراکز بازسازی ذخایر و تکثیر کپوردریایی می‌تواند به منظور بهبود خصوصیات تولیدمثلی و موفقیت در تولیدمثل مولدین ماده مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اطلاعات فیزیولوژیکی به‌دست آمده از تحقیق حاضر می‌تواند در جهت مدیریت بهتر و صحیح‌تر کارگاههای تکثیر کپوردریایی، سالن‌های هچری و همچنین در امر بازسازی ذخایر این ماهی ارزشمند و تجاری بسیار مفید باشد. ضمن اینکه باتوجه به مشکلاتی که درحال حاضر در زمینه تکثیر ماهیان دریایی در کشور با آنها مواجهه هستیم، پیشنهاد می‌گردد استفاده از هورمون اولین در ماهیان دریایی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان ذخایر ماهیان دریایی را در کشور بهبود بخشید. همچنین پیشنهاد می‌گردد تاثیر سطوح مختلف هورمون اولین بر سایر ماهیان و از جمله ماهیان ارزشمندی همانند ماهیان خاویاری مورد بررسی قرار گیرد.
- نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دوزهای ۰/۶ و ۰/۷ میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن بهترین تاثیر را بر شاخص‌های خونی و هورمون‌های استروئیدی مورد مطالعه در کپوردریایی ماده داشته‌اند و می‌توان از دوزهای فوق برای تزریق مولدین ماده کپوردریایی در تکثیر مصنوعی استفاده کرد. اما باتوجه به هزینه‌های خرید هورمون و اینکه پیشنهاد شرکت سازنده ۰/۵ میلی‌لیتر بر کیلوگرم بوده و در کارگاه تکثیر نیز از همین دوز استفاده می‌گردد پیشنهاد می‌گردد برای حداکثر بازدهی و صرفه اقتصادی از دوز ۰/۶ میلی‌لیتر بر کیلوگرم برای تکثیر مولدین کپور استفاده گردد.
- ### تشکر و قدردانی
- از جناب آقای مهندس شکبای ریاست محترم مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز سیجوال در بندرترکمن استان گلستان و جناب آقای مهندس عبدالجبار قزل کارشناس ارشد تکثیر که در انجام این بررسی نهایت همکاری و مساعدت را داشتند کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
- ### پست الکترونیک نویسندگان
- مجید محمدنژاد: m_mohammadnejad2013@yahoo.com
- ### REFERENCES
- Abdulraheem S.O., Otubusin O.T., Agbebi O., Olowofeso K.A., Adeyemi A.S.S. 2012. Induced Breeding of African Catfish (*Clarias gariepinus*) Under Varying Brood Stock Ratios. *Global Journal of Science Frontier Research*, 12:1-11.
- Akhondian M., Savari A., Salamat N., Movahdynya A.A., Salari M.A. 2015. Changes in plasma level of steroid hormones (Estradiol 17 β , 17 α 20 β Hydroxy Progesteron and Cortisol) and electrolytes, during different stages of reproductive cycle in *Rutilus rutilus caspicus* from Bandar Torkaman (South of Caspian Sea). *Oceanography*, 6 (21): 117-126. (In Persian).
- Ayoola S., Kuton P., Chukwu S. 2012. Comparative study of piscine and non-piscine pituitary extract and ovulin for inducing spawning in catfish (*Clarias*

- Research in Animal and Veterinary Sciences, 4(3): 1-7.
- Imanpour M., Zadmajid V. 2010. Introduction to fish breeding. Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources Press. 192 p.
- Khara H, Falahatkar B, Meknatkhah B, Rahbar M, Ahmadnezhad M. 2014. Effects of injection estradiol-17 β on hemetrotological indices in juvenile stellate sturgeon (*Acipenser stellatus*). Journal of Marine Biology, 6 (1) :73-79. (In Persian).
- Khodadost A., Imanpour M.R., Khara H., Taghizadeh V. 2015. Sexual maturity. And the level of steroid hormones in Pike (*Esox Lucius* Linnaeus, 1758) in Anzali wetland. Journal of Aquaculture Development, 9(1): 33-41. (In Persian).
- Kime D.E., Dolben I.P. 1985. Hormonal Changes during Induced Ovulation of the Carp, *Cyprinus carpio* General and Comparative Endocrinology, 58: 137-149.
- Lee W.K., Yang S.W. 2002. Relationship between ovarian development and serum levels of gonadal steroid hormones, and Induction of oocyte maturation and ovulation in the cultured female Korean spotted sea bass *Lateolabrax maculatus*. Aquaculture, 207: 169-183.
- Linhart O., Cheng Y., Xin M., Rodina M., Tučková V., Shelton L., Kašpar, V. 2020. Standardization of egg activation and fertilization in sterlet (*Acipenser ruthenus*). Aquaculture Reports, 17: 1-8.
- Mamndeyati U.N., Otebe J.A., Ibagye O.M., Agatsa T.D. 2018. Effect of varying dosage of Ovulin on the breeding performance of *Clarias gariepinus* in improvised hatchery tanks in Benue state university, Makurdi, Benue State, Nigeria. Trends in Science & Technology Journal, 3 (1): 230-233.
- Maradun H.F., Umar F., Ibrahim A., Mubarak A., Zarau I.J., Muhammad S.A., 2018. Effect of Different Doses of Ovulin Hormone on the Induced Breeding Performance of *Clarias gariepinus*. Journal of Animal and Veterinary Sciences, 5(1):1-5.
- Metwally M.A.A., Fouad I.M. 2008. Some biochemical changes associated with injection of grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*) with Oviaprim and Pregnyl for induction of artificial spawning. Global Veterinaria, 6: 320-326.
- Mohammad Nejad M. 2017. Comparison of Blood Parameters and some Biochemical Factors and Blood Serum Enzyme Rainbow Trout Fed with Manual and Commercial (Pellet) Food Diet. Journal of Animal Physiology and Development, 39: 10(4): 69-79. (In Persian).
- Mohammad Nejad M., Shahrokhi S., Ghelichi A. 2018. Evaluation of some haematological, enzymes and immunological blood indices of Carp (*Cyprinus carpio*) fed with different levels of vitamins C and E. Journal of Animal Physiology and Development, 43, 11(4):75-85. (In Persian)
- Mosha S.S. 2018. Recent Comparative Studies on the Performance and Survival Rate of African Catfish (*Clarias gariepinus*) Larval Produced under Natural and Synthetics Hormones: A Review. Journal of Aquaculture Research Development, 9(3): 1-6.
- Müller T., Kucska B., László H., Ittész A., Urbányi B., et al. 2018. Successful, induced propagation of African catfish (*Clarias gariepinus*) by ovarian lavage with sperm and hormone mixture. Aquaculture, 485: 197-200.
- Mylonas C.C., Zohar Y. 2001. Use of GnRHa-delivery systems for the control of reproduction in fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10: 463-491.
- Nikoo M., Falahatkar B., Alekhorshid M., Haghi B.N., Asadollahpour A., Dangsareki M.Z., Ershad Langroudi H. 2010. Physiological stress responses in kutum, *Rutilus frisii kutum* subjected to captivity. International Aquatic Research, 2: 55-60.
- Rafati H., Mirvaghefi A., Soltani M. 2016. The study of Anderogenic changes of some immunity parameters in *Oncorhynchus mykiss*. Journal of Fisheries, 68(4): 545-554. (In Persian).
- Rainis S., Ballestrazzi R. 2005. The control of reproduction in finfish species through GnRH treatments, Italian Journal of Animal Science, 4:4: 345-353,
- Salamat N., Alboghobeish N., Hashemitabar M., Mesbah M., Ahangarpour A. 2009. Pituitary primary cell culture of Common carp (*Cyprinus carpio*) and evaluation of its secretion effect on endocrine activity of incubated ovarian follicles. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 10(1): 61-65
- Shirmohammadli H., Mohammad Nejad M. 2021. Investigation of changes in some blood parameters of common carp (*Cyprinus carpio*) in different weights. Journal of Experimental Animal Biology, 9(3): 43-53. (In Persian).
- Shirmohammadli H., Mohammad Nejad M., Alami Rostami Sh. 2020. The relationship between weight and changes in some of the hematologic and biochemical indices of silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). Journal of Animal Environment, 12(2): 233-238. (In Persian).
- Taghizadeh V., Imanpoor M.R., Mehdinejad N. 2013. Study the Seasonal Steroid Hormones of Common Carp in Caspian Sea, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences, 5 (3): 282-285.
- Ukwe I.O.K., Abu O.M.G. 2016. Evaluation of Efficacy and Cost Effectiveness of Ovulin and Ovaprim Hormones for Spawning of African Catfish (*Clarias gariepinus*). Journal of Fisheries Sciences, 10(4): 052-063.
- Yeganeh S., Aghili K., Amini K. 2019. The investigation on variation of ionic and hormone indices in wild and wild cultivated carp brood stocks (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758). Journal of Applied Ichthyological Research, 6 (3):85-98. (In Persian).
- Zadmajid V., Vaziry A. 2016. Immune response and changes in serum biochemical and enzymes of goldfish broodstock (*Carassius auratus gibelio*) injected with human chorionic gonadotropin (HCG). Journal of Fisheries Science and Technology, 5 (2):45-58. (In Persian).

نحوه استناد به این مقاله:

محمدنژاد م. ۱۴۰۱. تعیین بهترین دوز تزریق هورمون اوالین در تکثیر مصنوعی ماهی ماده کپوردریایی (*Cyprinus carpio*) با بررسی برخی از فاکتورهای خونی و هورمون‌های استروئیدی. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی، (۲): ۱۰: ۴۷-۳۹
<https://doi.org/10.22034/jair.10.2.41>

Mohammad Nejad M. 2022. Determining the best dose of Ovulin hormone injection in artificial reproduction of *Cyprinus carpio* by examining some blood factors and steroid hormones. Journal of Applied Ichthyological Research, 10(2): 39-47. <https://doi.org/10.22034/jair.10.2.41>

Determining the best dose of Ovulin hormone injection in artificial reproduction of *Cyprinus carpio* by examining some blood factors and steroid hormones

Mohammad Nejad M.

Associate Prof., Dept. of Fishery, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran.

Type:

Original Research Paper

<https://doi.org/10.22034/jair.10.2.41>

Paper History:

Received: 16-09-2021

Accepted: 19-02- 2022

Corresponding author:

Mohammad M. Associate Prof., Dept. of Fishery, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran.

Email: m_mohammadnejad2013@yahoo.com

Abstract

This study was performed to evaluate the best dose of Ovulin hormone in artificial reproduction of female sea carp broodstocks in the spring of 2021 in the bone reproduction and breeding center of Sijual in Bandar-e-Turkmen, Golestan province. 12 adult female sea carp with an average weight of 1750.46 ± 312.58 g were injected at doses of 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7 ml / kg body weight of Ovulin hormone. Blood samples were taken from fish in two stages. The first stage was before injection and the second stage was 12-12 hours after injection. The results of hematological indices showed that injection of different doses of Ovulin hormone had no effect on the number of red blood cells, white blood cells, hemoglobin MCV, MCH and MCHC. But decreases hematocrit and granulocytes and increases monocytes. The results of biochemical factors showed the amount of glucose and cortisol increased in all treatments and the amount of triglyceride, cholesterol, total protein, albumin, calcium, potassium and sodium decreased in all treatments. Also, the results of steroid hormone analysis showed that by injecting different doses of Ovulin hormone, the amount of testosterone, estradiol and progesterone in all treatments increases. The results of this study showed that doses of 0.6 and 0.7 ml / kg body weight had the best effect on blood indices and steroid hormones studied in female sea carp. However, it is suggested that for maximum efficiency and economic efficiency, a dose of 0.6 ml / kg be used to female sea carp broodstocks.

Keywords: Female Broodstocks, Sea Carp, Ovulin Hormone, Hematology, Sex Hormones.