



بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) در سد گلستان و سد وشمگیر استان

گلستان – شمال ایران

عیسی حاجی‌رادکوچک^۱، رحمان پاتیمار^{۲*}، محمد هرسیج^۳، رسول قربانی^۴

^۱ دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

^۲ دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

^۳ استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

^۴ دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این مطالعه تعداد ۲۴۷ عدد ماهی کاراس (*C. gibelio*) از منطقه سد گلستان و تعداد ۲۰۸ عدد ماهی از منطقه سد وشمگیر به صورت ماهانه از اسفند ماه ۹۳ تا مهرماه ۹۴ به وسیله تور پره صید و پارامترهای سن و رشد این ماهی بررسی و تعیین شد. پراکندگی دامنه طول کل و وزن کل به ترتیب در سد گلستان از ۴۱ تا ۱۹۶ میلی‌متر و ۱/۲۵ تا ۱۴۱/۳۵ گرم و در سد وشمگیر از ۴۴ تا ۲۴۰ میلی‌متر و ۱/۷۳ تا ۲۸۰/۶ گرم بود. رابطه طول-وزن در جمعیت سد گلستان $W = 0.021 TL^{2.92}$ و در جمعیت سد وشمگیر $W = 0.027 TL^{2.79}$ محاسبه شد. پارامترهای رشد فان بر تالنفی متناسب با میانگین طول کل در سن مشاهده و در هر جنس به طور جداگانه در سد گلستان ($L_{\infty} = 378/09$ mm, $K = 0.12$, $t_0 = -0/43$) در جنس ماده و ($L_{\infty} = 309/38$ mm, $K = 0.17$, $t_0 = -$) و سد وشمگیر ($L_{\infty} = 408/70$ mm, $K = 0.13$, $t_0 = -0/35$) در جنس نر و ($L_{\infty} = 186/23$ mm, $K = 0.51$, $t_0 = -0/42$) در جنس نر و ($L_{\infty} = 302/94$ mm, $K = 0.04$, $t_0 = -0/73$) در جمعیت محاسبه شد.

واژه‌های کلیدی:

C. gibelio، پارامترهای فان بر تالنفی، رابطه طول-وزن، سد گلستان و وشمگیر

نوع مقاله:

پژوهشی اصیل

تاریخچه مقاله:

دریافت: ۹۵/۰۲/۰۵

پذیرش: ۹۵/۰۶/۰۹

DOI: 10.22034/jair.9.4.11

نویسنده مسئول مکاتبه:

رحمان پاتیمار، دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ایمیل: rpatimar@yahoo.com

۱ | مقدمه

تنوع‌پذیری وسیع منطقه‌ای بوده که به وسیله تنوع در ویژگی‌های زیستگاهی قابل تفسیر می‌باشد (Zivkov, 1996; Froese and Binohlan, 2000). در این راستا، مطالعه ویژگی‌های سن و رشد یک‌گونه در سطح جمعیتی و تنوع‌پذیری به صورت منطقه‌ای امکان درک بهتر از وضعیت جمعیت‌های یک گونه در یک منطقه را فراهم می‌کند (Zivkov, 1996). برای حصول به اهداف این قبیل مطالعات مقایسه‌ای، یافتن یک گونه با فراوانی بالا در مناطق مختلف یک حوضه، مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مسئله است (Patimar et al., 2011). حوضه گرگانرود از ارتفاعات شرق و جنوب‌شرقی استان گلستان شروع و در نهایت به دریای خزر ختم می‌گردد. ارتفاعات این حوضه از حدود ۲۹۷۷ متر واقع در زیر حوضه قره‌چای تا ۲۶ متر از سطح دریا متغیر می‌باشد. ۳ سد بوستان، گلستان و وشمگیر بر روی رودخانه گرگانرود قرار گرفته است. حوضه آبریز گرگانرود از حدود ده حوضه فرعی تشکیل می‌شود که بزرگترین آن حوضه سد وشمگیر می‌باشد (Kiabi et al., 1999). سد وشمگیر در طول جغرافیایی ۵۴ درجه و ۴۶ دقیقه شرقی و در

استان گلستان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و سایر عوامل محیطی از اکوسیستم‌های مختلف و متنوعی تشکیل گردیده که در بین آنها اکوسیستم‌های آبی چه در بخش رودخانه‌ای و تالابی و چه در بخش دریایی دارای ویژگی‌های خاص بوده و بسیار حائز اهمیت می‌باشند. سن و رشد در مطالعات ارزیابی ذخایر از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. توانایی تعیین سن ماهی یک ابزار مهم بیولوژی شیلاتی بوده و برای درک پویایی جمعیت‌های ماهی بسیار ضروری است. به‌منظور مطالعه تاریخ حیات ماهی و شرایط زیست محیطی حاکم، آگاهی از سن و میزان رشد ماهی الزامی است و مطالعه سن و رشد طول دوره حیات ماهی، شرایط محیطی، سن رسیدگی جنسی و سن تکثیر و تولیدمثل را مشخص سازد. کلیه روش‌های ارزیابی ذخایر با استفاده از داده‌های ترکیب سنی انجام می‌شود. تخمین‌های نسبت رشد و سن از مهم‌ترین ورودی‌های مدل‌های ارزیابی ذخایر بوده که برای ارزیابی آثار صید بر دینامیک جمعیت استفاده می‌شوند (Pitcher and Hart, 1982). مطالعات بسیاری نشان دادند که ویژگی‌های رشد ماهیان دارای

$$t = \frac{sd(\ln TL)}{sd(\ln W)} \times \frac{|b-3|}{\sqrt{1-r^2}} \times \sqrt{n-2} \quad (2)$$

در معادله ۲، $sd(\ln TL)$ انحراف معیار لگاریتم طبیعی طول کل (میلی‌متر)، $sd(\ln W)$ انحراف معیار لگاریتم طبیعی وزن کل (گرم)، b شیب خط رگرسیون طول - وزن، r^2 ضریب همبستگی و n تعداد نمونه است. t محاسباتی حاصل از این معادله با مقدار t جدول مقایسه می‌گردد. اگر t محاسباتی بزرگتر از t جدول نباشد می‌توان b معادله ۱ را برابر با ۳ در نظر گرفت که نشان‌دهنده ایزومتریک بودن الگوی رشد است. ضریب وضعیت هم به وسیله معادله ۳ تعیین گردید:

$$K = (W / TL^b) \times 100 \quad (3)$$

در معادله ۳، K ضریب وضعیت، W وزن کل به گرم، TL طول کل به سانتی‌متر و b شیب خط رگرسیونی طول کل - وزن کل می‌باشد. ضریب رشد لحظه‌ای نیز به وسیله معادله ۴ تعیین شد:

$$G = (\ln w_{t+1} - \ln w_t) / \Delta T \quad (4)$$

در این معادله، G ضریب رشد لحظه‌ای، w_t میانگین وزن کل به گرم گروه سنی t و w_{t+1} میانگین وزن کل به گرم گروه سنی $t+1$ می‌باشند، بررسی شد (Mann, 1973). پارامترهای معادله رشد فان‌برتالانفی طبق معادله (۵) $(L_t = L_\infty(1 - e^{-k(t-t_0)}))$ طبق روش فوردوالفورد $(L_t = L_\infty(1 - e^{-k(t-t_0)}))$ تعیین شد (Bagenal, 1978) که در آن $L_\infty = \frac{a}{1-b}$ ، $k = \frac{-\ln b}{\Delta t}$ می‌باشد. به علت تغییرات فصلی در ضریب بهتر است رشد بر حسب طول محاسبه شود (Bagenal, 1978) در این معادله L_t (سانتی‌متر) طول در زمان t ، L_∞ (سانتی‌متر) طول بی‌نهایت، b شیب خط منحنی رشد نسبت به طول و a ضریب ثابت آن می‌باشد، t_0 زمان فرضی است که ماهی طول صفر دارد. t_0 نیز از رابطه $K_t = \ln(-\frac{L(t)}{L_\infty}) - K_{t_0+1}$ تعیین گردید که در آن $t_0 = -\frac{a}{b}$ می‌باشد (Bagenal, 1978). برای سنجش L_∞ و k محاسباتی از آزمون فی‌مونرو استفاده شد (Pauly and Munro, 1984).

$$\Phi = \ln k + 2 \ln L_\infty \quad (6)$$

L_∞ (سانتی‌متر) طول بی‌نهایت، k (درسال) آهنگ رشد رسیدن به طول بی‌نهایت (Pauly and Munro, 1984). جهت وارد کردن داده‌ها و رسم نمودارها از برنامه Excel-2015 و آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-22 استفاده شد.

۳ | نتایج

تعداد کل نمونه‌ها تهیه شده از سد گلستان استان گلستان ۲۴۷ قطعه بود. از این تعداد، ۲۲۵ نمونه ماده و ۲۲ نمونه نر بود. نسبت جنسی نر به ماده ۱۰/۲۳ : ۱ در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده (۱ : ۱) داشت ($p < 0.05$ ، $\chi^2 = 166/84$)، لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در منطقه مورد مطالعه نابرابر می‌باشد. در جنس ماده، میانگین

عرض ۳۷ درجه و ۱۳ دقیقه شمالی در شمال شرقی شهر آق‌قلا و در فاصله ۴۲ کیلومتری این شهر و در محلی به نام سنگرسوار بر روی رودخانه گرگانرود احداث گردیده است. حوضه آبریز این سد تا محل احداث در حدود ۷۱۵۶ کیلومتر وسعت دارد و محیط آن ۴۹۷ کیلومتر می‌باشد. طول شاخه اصلی ۱۵۳ کیلومتر است (Yousefi, 1991). سد گلستان در بالا دست سد وشمگیر و در محدوده دشت گرگان در حوالی روستای عرب‌سورنک در عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۹ دقیقه شمالی و طول ۵۵ درجه و ۱۶ دقیقه شرقی در فاصله ۱۵ کیلومتری شمال شرقی گنبد کاووس واقع شده است. این سد روی شاخه اصلی گرگانرود احداث شده است (Yousefi, 1991). از لحاظ سیستماتیک ماهی کاراس (*C. gibelio*) از خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) و از جنس (*Carassius*) می‌باشد. در شرایط طبیعی اعتقاد بر این است که این گونه همه چیزخوار بوده و از مواد گیاهی و جانوری تغذیه می‌نماید (Zhadin and Gerd, 1961). در رژیم غذایی این ماهی گیاهان غوطه‌ور و لاروهای شیرونومیده نقش مهمی دارند. در طول زمستان تغذیه این ماهی تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد (Nikolskii, 1961). به دلیل وجود شرایط خاص محیطی در آبگیرهای استان گلستان و عدم مطالعات کافی در این شرایط محیطی و با توجه به نقشی که این ماهی به عنوان گونه رقیب در جامعه زیستی کپورماهیان پرورشی ایفا می‌نماید و ضرورت شناخت و تمایز گونه‌های طبیعی از پرورشی، بررسی خصوصیات زیستی و پارامترهای جمعیتی این ماهی ضروری به نظر می‌رسد. در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد ماهی کاراس نقره‌ای در شرایط خاص آبگیرهای استان گلستان پرداخته خواهد شد.

۲ | مواد و روش‌ها

به منظور انجام مطالعات مربوطه نمونه‌برداری از اسفند ماه ۱۳۹۳ تا مهر ماه ۱۳۹۴ به صورت ماهانه با استفاده از تور پره با قطر چشمه ۲/۵ میلی‌متر و طول ۱۰ متر با ارتفاع ۱/۵ متر انجام شد. تعداد کل نمونه‌های مورد بررسی در منطقه سد گلستان ۲۴۷ قطعه و در منطقه سد وشمگیر ۲۰۸ قطعه بود. نمونه‌های صید شده در محل به وسیله فرمالین ۱۰ درصد تثبیت شدند و بعد از انتقال به آزمایشگاه دانشگاه گنبد کاووس، بیومتری گردیدند. طول کل به وسیله تخته بیومتری با دقت ۱ میلی‌متر، وزن کل و وزن گناد نمونه‌ها به وسیله ترازو با دقت ۰/۰۰۱ گرم اندازه‌گیری گردید. تعیین سن ماهیان از روی فلس انجام گرفت. نسبت جنسی به وسیله آزمون مربع کای سنجش شد. الگوی رشد به وسیله معادله ۱ بررسی گردید:

$$W = aTL^b \quad (1)$$


در این معادله W وزن به گرم، TL به میلی‌متر، b شیب خط رگرسیونی و a عدد ثابت می‌باشند. رابطه‌ی بین طول و وزن ماهیان با جای گذاری داده‌ها در رابطه‌ی نمائی $W = aTL^b$ و تبدیل آن به رابطه‌ای خطی $\ln W = \ln a + b \ln L$ به کمک لگاریتم طبیعی تعیین شد (Bagenal, 1978)، ایزومتریک و آلومتریک بودن رشد به وسیله آزمون پائولی (معادله ۲) تعیین شد:

انحراف معیار برابر $۳۵/۶۵ \pm ۲۰/۱۸$ گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده بین ۲۴۰ - ۴۴ میلی‌متر و وزن کل بین ۲۸۰/۶۰ - ۱/۷۳ گرم بود. درحالی‌که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین ۱۷۹ - ۸۵ میلی‌متر و وزن کل بین ۸۱/۷۵ - ۹/۰۳ گرم مشاهده گردید (جدول ۱). در جمعیت ماهی کاراس (*C. gibelio*) سد گلستان، بیشترین فراوانی جنس نر در کلاسه طولی ۵۱-۶۰ میلی‌متر و ماده در کلاسه طولی ۴۱-۵۰ میلی‌متر بود و جنس نر در کلاسه‌های طولی ۷۰-۶۱، ۱۴۰-۱۳۱، ۱۵۰-۱۴۱، ۱۷۰-۱۶۱، ۱۸۰-۱۷۱، ۱۹۰-۱۸۱ و ۲۰۰-۱۹۱ مشاهده نشد، درحالی‌که جنس ماده در تمام کلاسه‌های طولی مشاهده شد (شکل ۱). در جمعیت ماهی کاراس (*C. gibelio*) سد وشمگیر، بیشترین فراوانی جنس نر در کلاسه طولی ۱۴۱-۱۵۰ میلی‌متر و ماده در کلاسه طولی ۱۵۱-۱۶۰ میلی‌متر بود و جنس نر در کلاسه‌های طولی ۴۱-۵۰، ۵۱-۶۰، ۷۱-۸۰، ۸۱-۹۰، ۱۹۱-۱۸۱، ۲۰۱-۲۱۰، ۲۱۱-۲۲۰، ۲۲۱-۲۳۰ و ۲۴۰-۲۳۱ مشاهده نشد و جنس ماده در کلاسه‌های طولی ۸۰-۷۱ و ۲۳۱-۲۲۱ مشاهده نشد (شکل ۲).

طول کل و انحراف معیار برابر $۹۴/۴۸ \pm ۳۷/۹۵$ میلی‌متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر $۲۱/۵۳ \pm ۲۳/۹۰$ گرم به‌دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و انحراف معیار برابر $۸۲/۹۱ \pm ۳۲/۷۹$ میلی‌متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر $۱۲/۹۱ \pm ۱۳/۳۱$ گرم مشاهده گردید. دامنه طول کل در جنس ماده بین ۱۹۶ - ۴۱ میلی‌متر و وزن کل بین $۱/۲۸ - ۱۴۱/۳۵$ گرم بود. درحالی‌که در جنس نر دامنه طول کل در جنس نر بین ۱۵۶ - ۴۲ میلی‌متر و وزن کل بین $۵۲/۴۲ - ۱/۲۵$ گرم مشاهده گردید (جدول ۱). تعداد کل نمونه‌ها تهیه شده از سد وشمگیر استان گلستان ۲۰۸ قطعه بود. از این تعداد، ۱۹۰ نمونه ماده و ۱۸ نمونه نر بود. نسبت جنسی نر به ماده $۱ : ۱۰/۵۶$ در جمعیت مورد مطالعه مشاهده گردید که این نسبت از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده (۱ : ۱) داشت ($p < ۰/۰۵$)، $\chi^2 = ۱۴۲/۲۳$ ، لذا فراوانی جنسی در جمعیت این گونه در منطقه مورد مطالعه نابرابر می‌باشد. در جنس ماده میانگین طول کل و انحراف معیار برابر $۱۳۷/۴۷ \pm ۴۰/۲۱$ میلی‌متر و میانگین وزن کل و انحراف معیار برابر $۵۱/۵۰ \pm ۴۰/۸۵$ گرم به‌دست آمد. در جنس نر میانگین طول کل و انحراف معیار برابر $۱۳۱/۱۷ \pm ۲۸/۵۱$ میلی‌متر و میانگین وزن کل و


جدول ۱- میانگین طول (میلی‌متر) و وزن کل (گرم) ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد گلستان و سد وشمگیر

منطقه	جنس	تعداد نمونه	TL±S.D	Max - Min	TW±S.D	Max - Min
سد گلستان	ماده	۲۲۵	۹۴/۴۸±۳۷/۹۵	۱۹۶ - ۴۱	۲۱/۵۳±۲۳/۹۰	۱۴۱/۳۵ - ۱/۲۸
	نر	۲۲	۸۲/۹۱±۳۲/۷۹	۱۵۶ - ۴۲	۱۲/۹۱±۱۳/۳۱	۵۲/۴۲ - ۱/۲۵
	جمعیت	۲۴۷	۹۳/۴۵±۳۷/۶۰	۱۹۶ - ۴۱	۲۰/۷۶±۲۳/۲۶	۱۴۱/۳۵ - ۱/۲۵
سد وشمگیر	ماده	۱۹۰	۳۷/۴۷±۴۰/۲۱	۲۴۰ - ۴۴	۵۱/۵۰±۴۰/۸۵	۲۸۰/۶۰ - ۱/۷۳
	نر	۱۸	۱۳۱/۱۷±۲۸/۵۱	۱۷۹ - ۸۵	۳۵/۶۵±۲۰/۱۸	۸۱/۷۵ - ۹/۰۳
	جمعیت	۲۰۸	۱۳۶/۹۲±۳۹/۳۲	۲۴۰ - ۴۴	۵۰/۱۳±۳۹/۷۱	۲۸۰/۶۰ - ۱/۷۳



شکل ۲- درصد فراوانی در کلاسه‌های طولی ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد وشمگیر

گروه سنی $(۱^+ - ۶^+)$ را برای جنس ماده و سه گروه سنی $(۲^+ - ۴^+)$ را برای جنس نر نشان داد (جدول ۲). فراوانی در گروه‌های سنی در نرها شامل ۲^+ (۴۴/۴۴ درصد)، ۳^+ (۵/۵۶ درصد) و ۴^+ (۵۰/۰۰ درصد) و در ماده‌ها شامل ۱^+ (۱۱/۵۸ درصد)، ۲^+ (۱۸/۹۵ درصد)، ۳^+ (۱۵/۷۹ درصد)، ۴^+ (۳۳/۶۸ درصد)، ۵^+ (۱۸/۴۲ درصد) و ۶^+ (۱/۵۸ درصد) می‌باشد. گروه سنی ۴^+ سه ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالب را تشکیل داده بود (شکل ۴). بزرگترین نمونه نر با طول کل ۱۷۹ میلی‌متر و سن ۴^+ بوده و بزرگترین ماده مشاهده شده نیز ۲۴۰ میلی‌متر طول و دارای سن ۶^+ بود.




شکل ۱- درصد فراوانی در کلاسه‌های طولی ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد گلستان


در سد گلستان تعیین سن از روی فلس شش گروه سنی $(۱^+ - ۶^+)$ را برای جنس ماده و چهار گروه سنی $(۱^+ - ۴^+)$ را برای جنس نر نشان داد (جدول ۲). فراوانی در گروه‌های سنی در نرها شامل ۱^+ (۳۶/۳۶ درصد)، ۲^+ (۵۰/۰۰ درصد)، ۳^+ (۹/۰۹ درصد) و ۴^+ (۴/۵۵ درصد) و در ماده‌ها شامل ۱^+ (۱۹/۱۱ درصد)، ۲^+ (۶۱/۷۸ درصد)، ۳^+ (۴/۰۰ درصد)، ۴^+ (۸/۸۹ درصد)، ۵^+ (۵/۷۸ درصد) و ۶^+ (۰/۴۴ درصد) می‌باشد. گروه سنی ۲^+ سه ساله در هر دو جنس نر و ماده جمعیت غالب را تشکیل داده بود (شکل ۳). بزرگترین نمونه نر با طول کل ۱۵۶ میلی‌متر و سن ۴^+ بوده و بزرگترین ماده مشاهده شده نیز ۱۹۶ میلی‌متر طول و دارای سن ۶^+ بود. در سد وشمگیر تعیین سن از روی فلس شش

جدول ۱- میانگین طول کل (سانتی‌متر) و وزن کل (گرم) در گروه‌های سنی مختلف در ماهی کاراس (*C. gibelio*) در دو سد گلستان و وشمگیر

منطقه	سن	ماده		نر	
		TL±S.D	TW±S.D	TL±S.D	TW±S.D
سد گلستان	۱*	۳/۵۱±۲/۶۰	۱/۹۳±۰/۶۶	۵/۵۰±۱/۲۳	۴/۹۸±۰/۵۵
	۲*	۱۵/۵۱±۱۱/۲۳	۱۴/۲۲±۷/۷۴	۸/۹۵±۲/۶۴	۹/۲۹±۱/۹۴
	۳+	۳۳/۸۰±۴/۵۸	۲۹/۸۳±۱/۵۱	۱۲/۶۷±۰/۳۷	۱۲/۴۰±۰/۱۴
	۴+	۵۰/۳۳±۱۰/۸۳	۵۲/۴۲±۰/۰۰	۱۴/۵۳±۰/۸۳	۱۵/۶۰±۰/۰۰
	۵+	۸۳/۴۶±۲۳/۶۲	-	۱۷/۰۲±۱/۳۹	-
	۶+	۱۴۱/۳۵±۰/۰۰	-	۱۹/۶۰±۰/۰۰	-
سد وشمگیر	۱*	۳/۷۸±۰/۹۰	-	۵/۷۳±۰/۵۷	-
	۲+	۲۱/۳۸±۴/۳۲	۱۷/۰۸±۵/۳۰	۱۰/۷۸±۰/۸۰	۱۰/۲۶±۱/۱۵
	۳*	۳۴/۹۲±۶/۵۰	۲۹/۲۵±۰/۰۰	۱۲/۹۴±۰/۷۴	۱۳/۶۰±۰/۰۰
	۴*	۶۰/۶۹±۱۵/۵۵	۵۲/۹۵±۱۲/۴۲	۱۵/۷۸±۰/۸۷	۱۵/۶۰±۰/۰۱
	۵+	۹۳/۸۲±۲۹/۳۶	-	۱۸/۰۲±۱/۲۱	-
	۶+	۲۳۸/۸۳±۴۷/۷۵	-	۲۲/۹۷±۱/۳۸	-




شکل ۵- فراوانی سنی ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد وشمگیر




شکل ۴- فراوانی سنی ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد گلستان

W= ۰/۰۱۷ TL^{۲/۹۷} (r^۲= ۰/۹۹) و برای جنس نر W= ۰/۰۱۷ TL^{۲/۹۷} (r^۲= ۰/۹۹) به دست آمد. در هر سه گروه جمعیت، ماده و نر ماهی کاراس (*C. gibelio*) سد وشمگیر، دارای ضریب همبستگی بالایی بود (شکل‌های ۷، ۹ و ۱۱) و مقادیر شیب خط رگرسیونی (b) با مقدار عددی ۳ به عنوان ضریب رشد ایزومتریک در تمام گروه‌ها اختلاف معنی‌داری داشت (t_{Male} = 2.20, t_{Female} = 0.93, p < 0.05) که نمایانگر رشد آلومتریک منفی در هر سه گروه می‌باشد. آزمون پائولی (Pauly and Munro, 1984)، برای تمام گروه‌ها آلومتریک منفی بودن الگوی رشد را در این گونه، تأیید نمود. در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد وشمگیر، رابطه طول و وزن جمعیت (۰/۹۸) W= ۰/۰۲۷ TL^{۲/۷۹} (r^۲= ۰/۹۸) و برای جنس ماده W= ۰/۰۲۷ TL^{۲/۷۹} (r^۲= ۰/۹۸) به دست آمد. در سد گلستان، رابطه طول و وزن جمعیت (۰/۹۹) W= ۰/۰۲۱ TL^{۲/۹۰} (r^۲= ۰/۹۹) و برای جنس ماده W= ۰/۰۲۱ TL^{۲/۹۰} (r^۲= ۰/۹۹) به دست آمد.

در هر سه گروه جمعیت، ماده و نر ماهی کاراس (*C. gibelio*) سد گلستان، دارای ضریب همبستگی بالایی بود (شکل‌های ۶، ۸ و ۱۰) و مقادیر شیب خط رگرسیونی (b) با مقدار عددی ۳ به عنوان ضریب رشد ایزومتریک در گروه نر اختلاف معنی‌داری نداشت (t_{Male} = 0.44, p > 0.05) که نمایانگر رشد ایزومتریک در گروه نرها می‌باشد ولی این مقدار در دو گروه جمعیت و ماده‌ها اختلاف معنی‌داری داشت (t_{Female} = 4.73, t_{Population} = 4.26, p < 0.05) که نشان‌دهنده رشد آلومتریک منفی در دو گروه جمعیت و ماده بود. آزمون پائولی (Pauly and Munro, 1984)، ایزومتریک بودن (b = 3) الگوی رشد در گروه نرها و برای دو گروه جمعیت و ماده‌ها آلومتریک منفی بودن الگوی رشد را در این گونه، تأیید نمود. در جمعیت مورد مطالعه ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد گلستان، رابطه طول و وزن جمعیت (۰/۹۹) W= ۰/۰۲۱ TL^{۲/۹۰} (r^۲= ۰/۹۹) و برای جنس ماده W= ۰/۰۲۱ TL^{۲/۹۰} (r^۲= ۰/۹۹) به دست آمد.



شکل ۷- رابطه طول - وزن کل جمعیت ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد وشمگیر



شکل ۶- رابطه طول - وزن کل جمعیت ماهی کاراس (*C. gibelio*) در سد گلستان

gibelio) در منطقه سد وشمگیر نیز مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۳). این پارامتر برای جنس نر، ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد. طول بی‌نهایت (L_{∞}) جنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود. آهنگ رشد (K) در جنس ماده بزرگتر از جنس نر بدست آمد. شاخص سن صفر (t_0) برای تمامی گروه‌های مورد بررسی (نر، ماده و جمعیت) منفی بود و برای جنس نر $-124/30$ و برای جنس ماده $-43/05$ به‌دست آمد. شاخص فی مونرو (Φ) در سه گروه جمعیت، نر و ماده در حد ۹-۱۱ با دامنه حداقل $9/78$ برای جنس نر و حداکثر $11/38$ برای جنس ماده متغیر بود.

پارامترهای معادله رشد فان‌برتالانفی برای ماهی کاراس (C. *gibelio*) در منطقه سد گلستان مورد بررسی قرار گرفت (جدول ۳). این پارامتر برای جنس نر، ماده و جمعیت مقادیر متنوعی را نشان داد. طول بی‌نهایت (L_{∞}) جنس ماده نسبت به جنس نر مقدار بزرگتری بود. آهنگ رشد (K) در جنس نر بزرگتر از جنس ماده به‌دست آمد. شاخص سن صفر (t_0) برای تمامی گروه‌های مورد بررسی (نر، ماده و جمعیت) منفی بود و برای جنس نر $-58/82$ و برای جنس ماده $-46/92$ بدست آمد. شاخص فی مونرو (Φ) در سه گروه جمعیت، نر و ماده در حد ۹ با دامنه حداقل $9/70$ برای جنس نر و حداکثر $9/75$ برای جنس ماده متغیر بود. پارامترهای معادله رشد فان‌برتالانفی برای ماهی کاراس (C. *gibelio*)

جدول ۳- پارامترهای معادله فان‌برتالانفی در سه گروه نر، ماده و جمعیت ماهی کاراس (C. *gibelio*) در دو سد گلستان و وشمگیر

منطقه	جنسیت	L_{∞}	K	t_0	Φ
سد گلستان	نر	۳۰۹/۳۸	۰/۱۷	-۰/۰۲	۹/۷۰
	ماده	۳۷۸/۰۹	۰/۱۲	-۰/۴۳	۹/۷۵
	جمعیت	۳۵۵/۷۴	۰/۱۳	-۰/۳۵	۹/۷۱
سد وشمگیر	نر	۱۸۶/۲۳	۰/۵۱	-۰/۴۲	۹/۷۸
	ماده	۴۰۸/۷۰	۰/۵۲	-۰/۲۰	۱۱/۳۸
	جمعیت	۳۰۲/۹۴	۰/۰۴	-۰/۷۳	۱۰/۶۰

۴ | بحث و نتیجه‌گیری

کشورهای دیگر همسو می‌باشد. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که دامنه طول کل این ماهی (C. *gibelio*) در منطقه سد گلستان در جنس ماده بین ۱۹۶-۴۱ میلی‌متر و در جنس نر بین ۱۵۶-۴۲ میلی‌متر و در منطقه سد وشمگیر در جنس ماده بین ۲۴۰-۴۴ میلی‌متر و در جنس نر بین ۱۷۹-۸۵ میلی‌متر می‌باشد. ترکان و همکاران (Tarkan et al., 2006) در مطالعه خود در دریاچه پشت سد عمرلی (Omerli dam lake) در ترکیه گزارش داد که دامنه وزنی ماهی کاراس بین ۸۶۰/۶-۴۰ گرم برای جنس ماده و $452/6$ - $43/3$ گرم برای جنس نر می‌باشد. در مطالعه دیگری در دریاچه ایزنیک (Iznik lake) در ترکیه گزارش شده که این دامنه در جنس ماده بین $565/2$ - $3/3$ گرم و در جنس نر بین $313/3$ - $1/98$ گرم است. (Gungor, 2012) در یک مطالعه بر روی دریاچه پشت سد ایکیزجه تپلر (Ikizcetepeler dam lake) در ترکیه نشان داد که وزن این ماهی (C. *gibelio*) بین 622 - $15/8$ گرم برای تمام جمعیت است (برای جنس ماده 622 - $16/5$ گرم و برای جنس نر $440/4$ - 15 گرم). نتایج این پژوهش نشان داد که دامنه وزنی این ماهی در سد گلستان بین $141/35$ - $1/28$ گرم برای جنس ماده و $52/42$ - $1/25$ گرم برای جنس نر و دامنه وزنی در سد وشمگیر بین $280/60$ - $1/73$ گرم برای جنس ماده و $81/75$ - $9/03$ گرم برای جنس نر می‌باشد. همچنین مقادیر به‌دست آمده در این پژوهش مشابه با سایر مطالعات انجام شده می‌باشد. نسبت جنسی نر- ماده به‌دست آمده در منطقه سد گلستان $10/23$: ۱ و در منطقه سد وشمگیر $10/56$: ۱ می‌باشد. (Gungor, 2012) گزارش کرده است که نسبت جنسی نر- ماده برای جمعیت این ماهی (C. *gibelio*) در دریاچه ایکیزجه تپلر

در مطالعه حاضر مشخص شد که توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس (C. *gibelio*) در دو منطقه سد گلستان و سد وشمگیر بین 6^+ - 1^+ سال مشاهده شد با این حال توزیع سنی این گونه در مناطق دیگر نیز بین 7^+ - 1^+ متفاوت می‌باشد. در مطالعه سیبل (Sibel, 2015) مشخص شد که توزیع سنی جمعیت ماهی کاراس (C. *gibelio*) در رودخانه سیحان ترکیه بین 5^+ - 1^+ است. لئوناردوس و همکاران (Leonardos et al., 2008) در مطالعه خود در دریاچه شیماتیدیس یونان نشان دادند که توزیع سنی این ماهی بین 6^+ - 1^+ می‌باشد. راگوزین و همکاران (Rogozin et al., 2011) در مطالعه خود در دریاچه شیرا در شمال سیبری اعلام کردند که توزیع سنی این گونه بین 15^+ - 1^+ تغییر می‌کند. گزارش شده است که این ماهی در آب‌های داخلی اروپا دارای توزیع سنی بین 11^+ - 10^+ می‌باشد (Szczerbowski, 2001; Kirankaya and Ekmekci, 2013). بولوت و همکاران (Bulut et al., 2013) گزارش دادند که جنس نر نسبت به جنس ماده دارای طول عمر کوتاه‌تری است. تفاوت در ترکیب سنی در مطالعات انجام شده در ماهی کاراس (C. *gibelio*) ممکن است به‌دلیل زمان‌های مختلف نمونه‌برداری و روش‌های ماهیگیری متفاوت رخ دهد. تسومانی و همکاران (Tsoumani et al., 2006) در مطالعات خود در ۱۲ دریاچه یونان نشان داد که دامنه طول کل این ماهی (C. *gibelio*) بین $37/7$ - $14/5$ سانتی‌متر است. لئوناردوس و همکاران (Leonardos et al., 2008) گزارش دادند که طول کل این ماهی در مناطق داخلی قسمت شمالی یونان بین 37 - $21/9$ سانتی‌متر است. در نتیجه داده‌های طولی مشاهده شده در این پژوهش با اطلاعات به‌دست آمده در مطالعات

و شمشیر به ترتیب برای جنس نر $L_{\infty} = 186/23 [1 - e^{-0/51(t+0/42)}]$ و برای جنس ماده $L_{\infty} = 408/7 [1 - e^{-0/52(t+0/20)}]$ محاسبه شد. پارامترهای رشد نشان داد که جنس ماده دارای حداکثر طول (L_{∞}) بیشتری نسبت به جنس نر بود (مقدار k در منطقه سد گلستان در جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر و در منطقه سد و شمشیر در جنس ماده نسبت به جنس نر بیشتر می‌باشد اما تفاوت در مقدار k در هر جنس خیلی کوچک است). در مطالعه اینال (Innal, 2012) در منطقه آنتالیای ترکیه مقدار L_{∞} برابر $36/86$ سانتی‌متر برای ماهی (*C. gibelio*) محاسبه شد. پارامترهای رشد فان برتالنفی با استفاده از فرمول طول کل در سن به ترتیب برای جنس نر $L_{\infty} = 35/96 [1 - e^{-0/239(t+0/882)}]$ و برای جنس ماده $L_{\infty} = 37/56 [1 - e^{-0/232(t+0/767)}]$ محاسبه شد. پارامترهای رشد نشان داد که جنس ماده دارای حداکثر طول (L_{∞}) بیشتری نسبت به جنس نر بود (مقدار k در جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود اما تفاوت در مقدار k در هر جنس خیلی کوچک بود). در مطالعه حاضر برای ارزیابی قابلیت اطمینان از پارامتر رشد آزمون فی مونرو- پائولی (Pauly and Munro, 1984) برای نشان دادن عملکرد کلی رشد استفاده شد. که مقدار فی (Φ') در منطقه سد گلستان $9/71$ و در منطقه سد و شمشیر $10/6$ به دست آمد. در مطالعه (Bulut et al., 2013) مقدار فی (Φ') ماهی کاراس (*C. gibelio*) در آبیندان سینتر (Seyitler) در ترکیه $5/37$ مشاهده شد. که احتمالاً به دلیل همگنی شرایط زیست محیطی مانند فراوانی غذا و درجه حرارت آب زیستگاه می‌باشد (Alp et al., 2005). حداکثر طول (L_{∞}) در ماهی کاراس (*C. gibelio*) در مطالعات زیادی به ترتیب $L_{\infty} = 36/2$ سانتی‌متر در دریاچه بیشه‌پیر ترکیه، $L_{\infty} = 31/66$ سانتی‌متر در دریاچه پشت سدی بولدان ترکیه، $L_{\infty} = 33/3$ سانتی‌متر در دریاچه اگیردیر ترکیه توسط (Balik et al., 2004) گزارش شده است. نتایج نشان داد این مقادیر در مطالعه ما با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه متفاوت است که می‌توان به تفاوت‌های زیست محیطی نسبت داد. مشخص شده که این ماهی به عنوان یک گونه معرف غیربومی مهاجم در محیط‌های طبیعی گونه‌های بومی، چرخه زندگی گونه‌های بومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این گونه دارای تحمل اکولوژیک بسیار گسترده‌ای می‌باشد و به سرعت در آب‌های داخلی در حال افزایش است. که اثرات آن می‌تواند نظیر رقابت غذایی و تولیدمثلی بین گونه‌های مهاجم و بومی باشد و در نتیجه باعث نابودی گونه‌های بومی شود. این گونه مهاجم ساکن زیستگاه‌های مختلف در آب‌های داخلی است بنابراین نیاز به نظارت و مطالعات بیشتر به جمعیت این گونه اختصاص یابد.

پست الکترونیک نویسندگان

عیسی حاجی‌راد کوچک: e_hajirad@yahoo.com
 رحمان پاتیمار: rpatimar@yahoo.com
 محمد هرسیج: m_harsij80@yahoo.com
 رسول قربانی: Ghorbaninasrabadi@yahoo.com

REFERENCES

Alp A., Kara C., Büyükçapar H.M., Bülbül O. 2005. Age, growth and condition of *Capoeta capoeta angorae* Hanko,

(Ikizcetepeler) در ترکیه $3/52$: 1 می‌باشد. کیرانکایا و اکمچی (Kirankaya and Ekmekci, 2013) این نسبت را $0/73$: 1 در دریاچه پشت سدی گلین گولو (Gelingullu) در ترکیه گزارش دادند. (Uysal et al., 2015) در دریاچه ایزنیک در منطقه بورسا در ترکیه گزارش دادند که این نسبت $0/51$: 1 در ماهی کاراس (*C. gibelio*) می‌باشد. بوستانچی و همکاران (Bostanci et al., 2007) اعلام کردند که در مطالعه خود در دریاچه بافرافیش (Bafralake) در ترکیه حدود $2/89$ درصد جمعیت را جنس نر تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، ساری و همکاران (Sari et al., 2008) گزارش دادند که $0/56$ درصد از جمعیت دریاچه پشت سدی بولدان (Buldan dam lake) ترکیه را جنس نر تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده پدیده بکرزایی (Gynogenesis) در این ماهی (*C. gibelio*) می‌باشد. به عنوان یک نتیجه از یافته‌های به دست آمده و یافته‌های حاصل از اطلاعات قبلی می‌توان گفت که این ماهی در این مناطق پدیده بکرزایی را نشان می‌دهد. در این مطالعه الگوی رشد در منطقه سد گلستان در جنس ماده از نوع آلومتریکی منفی و برای جنس نر از نوع ایزومتریکی و الگوی رشد در سد و شمشیر در جنس ماده از نوع ایزومتریکی و برای جنس نر از نوع آلومتریکی منفی مشاهده شد. در مطالعه (Sibel, 2015) مقدار $b = 2/57$ بود که الگوی رشد آلومتریکی منفی برای تمام جمعیت ماهی کاراس (*C. gibelio*) گزارش شد. در مطالعه دیگری توسط (Kirankaya and Ekmekci, 2013) برای جنس ماده مقدار $b = 3/05$ دارای رشد ایزومتریکی و برای جنس نر $b = 2/80$ دارای رشد آلومتریکی منفی گزارش شد. همچنین مقدار b در مطالعات دیگر برترتیب $b = 2/97$ در دریاچه بافرافیش (Bafralake) ترکیه توسط (Bostanci et al., 2007) و $b = 2/87$ در دریاچه بولدان (Buldan dam lake) ترکیه توسط (Sari et al., 2008) و مقدار $b = 2/59$ در دریاچه پشت سدی ایکیزجه تپلر (Ikizcetepeler dam lake) ترکیه توسط (Gungor, 2012) و همچنین مقدار $b = 2/65$ در دریاچه سیحان (Seyhan dam lake) ترکیه توسط (Erguden, 2015) به دست آمده است. مشاهده شده که یافته‌های ما مشابه با یافته‌های حاصل از مطالعات در سال‌های گذشته می‌باشد. ساختار ایزومتریکی و آلومتریکی فصلی یک گونه ماهی دارای اهمیت قابل ملاحظه‌ای است. اندازه متغیر نمونه و دامنه تغییرات طولی می‌تواند باعث تغییر مقدار b در جمعیت یک گونه شود (Froese, 2006). روابط طولی وزنی ماهی به طور قابل توجهی مربوط به فصل و برخی از عوامل از قبیل استرس، فعالیت تولیدمثلی، محیط و مواد غذایی می‌باشد (Le Cren, 1951; Froese, 2006; Leonardos et al., 2008; Saylar and Benzer, 2014). تغییر در رشد ماهی (طولی وزنی) می‌تواند با استفاده از تطبیق با شرایط مختلف زیست محیطی صورت گیرد (Nikolsky, 1963). در مطالعه حاضر در منطقه سد گلستان مقدار L_{∞} برابر $355/74$ سانتی‌متر و در منطقه سد و شمشیر مقدار L_{∞} برابر $999/75$ سانتی‌متر برای ماهی (*C. gibelio*) محاسبه شد. پارامترهای رشد فان برتالنفی با استفاده از فرمول طول کل در سن در سد گلستان به ترتیب برای جنس نر $L_{\infty} = 309/38 [1 - e^{-0/17(t+0/02)}]$ و برای جنس ماده $L_{\infty} = 378/09 [1 - e^{-0/12(t+0/43)}]$ و در سد

- 1924 from the upper water systems of the river Ceyhan. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29:665-676.
- Bagenal T.B. 1978. Methods for assessment or fish production in freshwater. Blackwell Scientific Pub. Oxford. London, U.K. 365p.
- Balik I., Özkök R., Çubuk H., Uysal R. 2004. Investigation of some biological characteristics of the silver crucian carp *Carassius gibelio* (Bloch 1782) population in Lake Eğirdir. Turkish Journal of Zoology, 28:19-28.
- Berg L.S. 1949. Freshwater fishes of the U.S.S.R and adjacent countries. Izdatelstvo Akademik Nauk. S.S.S.R., Moskva-Leningrad, Russia. pp: 385-390.
- Bostanci D., Polat N., Akyurek M. 2007. Some biological aspects of the crucian carp, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) inhabiting in Egirdir Lake. International Journal of Engineering Science, 1:55-58.
- Bulut S., Mert R., Algan B., Özbek M., Ünal B., Konuk M. 2013. Several growth characteristics of an invasive Cyprinid fish (*Carassius gibelio* Bloch, 1782). Notulae Scientia Biologicae, 5:133-138.
- Erguden S.A. 2015. Determination of condition factor and length-weight relationship of the Prucian carp, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Technological Research, 1:157-166.
- Froese R., Binohlan C. 2000. Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. Journal of Fish Biology, 758-773.
- Froese R. 2006. Cube law, condition factor and weight-length relationships: history, meta-analysis and recommendations. Journal of applied Ichthyology, 22:241-253.
- Gungor H.S. 2012. An investigation on the biological aspects of the Gibelio, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in the İkizcetepeler Dam Lake. Msc Thesis, Balıkesir University of Institute of Science Biology, Turkey. (In Turkish).
- Innal D. 2012. Age and growth properties of *Carassius gibelio* (Cyprinidae) living in Aksu River Estuary (Antalya-Turkey). Review of Hydrobiology, 5(2): 97-109.
- Kiabi B., Abdulı A., Ghaemi R. 1999. Wetlands and river ecosystems of Golestan province. The Department of Environment Golestan province, Iran. 182 p.
- Kirankaya S.G., Ekmekci F.G. 2013. Life-history traits of the invasive population of Prussian carp, *Carassius gibelio* (Actinopteri: Cypriniformes: Cyprinidae), from Gelingüllü Reservoir, Yozgat, Turkey. Acta Ichthyology Piscat, 43:31-40.
- Le Cren E.D. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in Perch, *Perca fluviatilis*. Journal of Animal Ecology, 20:201-219.
- Leonardos I.D., Tsikliras A.C., Eleftheriou V., Cladas Y., Kagalou I., Chortatu R., Papigiöt O. 2008. Life history characteristics of an invasive cyprinid fish (*Carassius gibelio*) in Chimaditis Lake (northern Greece). Journal of applied Ichthyology, 24:213-217.
- Mann R.H.K. 1973. Observation on the age, growth, reproduction and food of the roch *Rutilus rutilus* (L) in two rivers in southern England. Journal of Fisheries and Biology, 5:707-736.
- Nikolskii G.V. 1961. Special ichthyology. (Translated by J.I. Iengy and Z. Krauthamer). The national science foundation, Washington, D.C., U.S.A. pp: 248-250.
- Nikolskii G.V. 1963. The ecology of fishes (translated by L. Birkett). Academic Press, London, UK. 352p.
- Patimar R., Habibi S., Jafari F. 2011. Study on Growth characteristics of *Alosa caspia caspia* (Eichwald, 1838) in Caspian Sea. Journal of Fisheries. Iran Natural Resources Review. 1 (64):15-27. (In Persian).
- Pauly D., Munro J.L. 1984. Once more on the comparison of growth in fish and vertebrates, ICLARM Fishbyte, 2(1): 21 p.
- Pitcher T.J., Hart P.J.B. 1982. Fisheries Ecology. Croom Helm, London, UK. 414p.
- Rogozin D.Y., Pulyayevskaya M.V., Zuev I.V., Makhutova O.N., Degermendzhi A.G. 2011. Growth, diet and fatty acid composition of Gibel carp *Carassius gibelio* in Lake Shira, a brackish water body in Southern Siberia. Journal of Siberian Federal University, 1:86-103.
- Sari H.M., Balik S., Ustaoglu R., Ilhan A. 2008. Population structure, growth and mortality of *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 25-29.
- Saylar Ö., Benzer S. 2014. Age and growth characteristics of carp (*Cyprinus carpio* L., 1758) in Mogan Lake, Ankara, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 46:1447-1453.
- Sibel A.E. 2015. Age and Growth Properties of Prussian Carp, *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) Living in the Middle Basin of Seyhan River in Adana, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 47(5): 1365-1371.
- Szczerbowski J.A. 2001. *Carassius Jarocki*, 1822. In: The freshwater fishes of Europe. (eds. P.M. Bănărescu and H.J. Paepke), Vol. 5. Cyprinidae 2. Part 3. *Carassius* to *Cyprinus*. Gasterosteidae. Aula-Verlag, Wiebelsheim, Germany, pp: 1-78.
- Tarkan A.S., Gaygusuz Ö., Gursoy Ç., Acipinar H., Bilge G. 2006. A new invasive species *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in Marmara Region: successful or unsuccessful? In 1. Ulusal Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 7-9 February 2006, Antalya, Turkey. pp: 193-203. (In Turkish).
- Tsoumani M., Liasko R., Moutsaki P., Kagalou I., Leonardos I. 2006. Length-weight relationships of an invasive Cyprinid fish (*Carassius gibelio*) from 12 Greek lakes in relation to their trophic states. Journal of applied Ichthyology, 22:281-284.
- Uysal R., Alp A., Yegen V., Yagci Apaydin M., Çetinkaya S., Yagci A., Bostan H., Cesur M., Kucukkara R. 2015. The growth properties of Prussian carp (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) population in İznik Lake (Bursa/Turkey). LIMNOFISH- Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1: 19-27. (In Turkish).
- Yousefi Gh. 1991. Report of Voshmgir Reservoir operation, Golestan Water Regional Co, Iran. 167 p. (In Persian).

- Zhadin V.I., Gerd S.V. 1961. Fauna and flora of the rivers, lakes and reservoir of the U.S.S.R. Izdatelstov academic nauk, S.S.S.R., Moskva-Leningrad., Russia. pp: 100-250.
- Zivkov M. 1996. Critique of proportional hypotheses and methods for back calculation of fish growth. Environmental Biology of Fishes, 46:309-320.

نحوه استناد به این مقاله:

حاجی‌رادکوکچک ع.، پاتیمار ر.، هرسجیج م.، قربانی ر. بررسی پارامترهای سن و رشد ماهی کاراس (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) در سد گلستان و سد وشمگیر استان گلستان - شمال ایران. نشریه پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی دانشگاه گنبدکاووس. ۱۴۰۰، ۱۹-۱۰: ۹(۴).

Hajiradkouchak E., Patimar R., Harsij M., Ghorbani R. Study on growth properties of *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in Golestan and Voshmgir dam Lake of Golestan Province-Northern Iran. Journal of Applied Ichthyological Research, University of Gonbad Kavous. 2021, 9(4): 10-19.

Study on growth properties of *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) in Golestan and Voshmgir dam Lake of Golestan Province- Northern Iran

Hajiradkouchak E¹., Patimar R^{2*}., Harsij M³., Ghorbani R⁴.

¹ Ph.D., Student, Faculty of Fisheries and Environment, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

² Associate Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

³ Assistant Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

⁴ Associate Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran

Type:

Original Research Paper

Paper History:

Received: 24-04-2016

Accepted: 31-08- 2016

Corresponding author:

Patimar R. Associate Prof., Dept. of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

Email: rpatimar@yahoo.com

Abstract

In this study, age and growth parameters of Prussian carp *C. gibelio* were examined using 247 specimens caught from the Golestan dam lake and 208 specimens from the Voshmgir dam lake. Sampling was carried out monthly over the period of February to September 2015. Total size distribution varied from 41 to 196 mm in length and 1.25 to 141.35 g in weigh and from 44 to 240 mm in length and 1.73 to 280.6 g in weigh in the Golestan and Voshmgir dam lakes respectively. Length-weight relationship of population was calculated as $W = 0.021 TL^{2.92}$ in Golestan dam lake and $W = 0.027 TL^{2.79}$ in Voshmgir dam lake. The parameters of von Bertalanffy growth fit the mean observed total lengths-at-age for each sex separately and were estimated as $L_{\infty} = 378.09$ mm, $k = 0.12$ year⁻¹, $t_0 = -0.43$ year for females, $L_{\infty} = 309.38$ mm, $k = 0.17$ year⁻¹, $t_0 = -0.02$ year for males, and as $L_{\infty} = 355.74$ mm, $k = 0.13$ year⁻¹, $t_0 = -0.35$ year for combined sexes in the Golestan dam lake, $L_{\infty} = 408.70$ mm, $k = 0.52$ year⁻¹, $t_0 = -0.20$ year for females, $L_{\infty} = 186.23$ mm, $k = 0.51$ year⁻¹, $t_0 = -0.42$ year for males, and as $L_{\infty} = 302.94$ mm, $k = 0.04$ year⁻¹, $t_0 = -0.73$ year for combined sexes in the Voshmgir dam lake.

Keywords: *C. gibelio*, Parameters of Von Bertalanffy, length-weight relationship, Golestan and Voshmgir Dam lakes.